

宠物大联盟



CHONGWU DALIANMENG

纯种猫

王巍 主编

湖南科学技术出版社

乖巧可爱的猫宝贝来啦

让你爱上它们的肉饼脸

让你爱上它们的无辜眼神

Pedigree Cat

《宠物大联盟——纯种猫》

让你没理由地爱上纯种猫猫





责任编辑:吴新霞 戴 涛
策 划:趣华文化
封面设计:张 阳
责任设计:刘苏斌

宠物大联盟 CHONGWU DALIANMENG



ISBN 978-7-5357-6527-7



9 787535 765277 >

定价: 25.00 元

宠物大联盟

纯种猫

王巍 主编



湖南科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

纯种猫 / 王巍主编. —长沙: 湖南科学技术出版社, 2011

(宠物大联盟)

ISBN 978-7-5357-6527-7

I. ①纯… II. ①王… III. ①猫 - 驯养 IV. ①S829.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第238364号

读者如有不明之处或需邮购, 请电话联系。

地 址: 长沙市车站北路70号万象企业公馆1808

网 址: <http://www.yhcul.com>

长沙市越华文化传播有限公司 邮编: 410001

电 话: 0731-84444800

宠物大联盟 纯种猫

策 划: 越华文化

主 编: 王 巍

责任编辑: 王 燕 戴 涛

编 委: 张 苗 刘利程

出版发行: 湖南科学技术出版社

社 址: 长沙市湘雅路276号

<http://www.hnstp.com>

邮购联系: 本社直销科 0731-84375808

版式设计: 盛小静

印 刷: 长沙湘诚印刷有限公司

(印装质量问题请直接与本厂联系)

厂 址: 长沙市开福区伍家岭新码头95号

版 次: 2011年第1版

2011年第1次印刷

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 6.5

书 号: ISBN 978-7-5357-6527-7

定 价: 25.00元

(版权所有·翻印必究)



前言 P R E F A C E

很多人都有过这样的经历：偶遇自己心仪的猫咪，伸手去逗逗它时，它却头也不回地跑开，骄傲的神情溢于言表。

猫是一种独立性很强的动物，因为这一点，很多人觉得猫不如狗那么有亲近感。但是养过猫（尤其是纯种猫）的朋友就一定知道，猫是一种对主人依赖性非常强的动物，只是这种依赖不轻易在陌生人面前表露。

在制作本书的过程中，发生了一些有趣的事情。在拍摄猫咪照片的时候，众多的“猫模特”中，有一只长得和加菲猫颇为神似的异国短毛猫，它是一只极度好吃的肥猫，各种拍摄道具它都不放过，一股脑往嘴巴里塞，发现不是食物之后便紧锁眉头，然后郁闷地吐出来，等最后发现没有自己能吃的东西以后，便只能抱着主人的小拇指不停吮吸，然后默默地睡去。这一连串的行为，就仿佛一个不懂事的小孩在排解自己不快乐的情绪。

除了对主人的依赖，猫咪还有很多优良的特质。谨慎、果敢、善良、细腻、大胆，这些优点使得你一旦选择了一只猫，就舍不得将它丢弃。

值得一提的是，猫也是一种需要悉心照料的动物，如果你们选择了一只猫，你就必须为它梳理毛发、更换猫沙、制作猫食。这一系列繁琐的事情，看似简单，其实中间还是充满学问的，这时你就需要一本专业的养猫宝典来参考。

本书从名猫介绍、选猫、养猫、训猫以及猫病防治等几个方面进行介绍，内容丰富，实用性强，并配以精美的猫咪照片，一定能让养猫的你爱不释手。

目录

CONTENTS

01



名猫介绍篇

MINGMAOJIESHAOPIAN

- 2 短毛猫
- 3 美国卷耳猫
- 6 苏格兰折耳猫
- 11 异国短毛猫
- 15 英国短毛猫
- 19 长毛猫
- 20 喜马拉雅猫
- 24 波斯猫
- 27 金吉拉

31

饲养篇

SHIYANGPIAN



- | | |
|-----------------|---------------|
| 32 新猫进家要不要隔离 | 50 猫猫寄养注意事项 |
| 33 猫粮的选择 | 52 让猫独自在家注意事项 |
| 34 各种猫粮的特点 | 54 老猫该如何照料 |
| 35 教你选猫沙 | 55 怎样喂养流浪新生幼猫 |
| 38 幼猫所需用品 | 59 猫咪盛夏洗澡注意事项 |
| 40 幼猫断奶期的喂饲注意事项 | 60 用温水给猫咪洗眼 |
| 41 让猫咪安全地吃鱼 | 61 适当为猫咪清理耳朵 |
| 43 不能让猫吃的东西 | 62 猫咪也要刷牙 |
| 45 猫咪换食有学问 | 63 长毛猫的梳理 |
| 46 不同年龄猫咪的喂饲方法 | 64 怎样护理患病的猫猫 |
| 48 怎样准备猫窝 | 65 如何给爱猫服药 |
| 49 猫的春季管理 | 67 猫的免疫与驱虫 |

69



训猫篇

XUNMAOPIAN

- 70 新来猫咪的管理方法
- 72 训练猫猫不认生
- 73 猫咪训练的注意事项
- 75 怎样矫正猫的夜游症
- 76 阻止猫的异常捕食行为
- 77 如何避免猫咪抓沙发

79



猫病防治篇

MAOBING FANGZHIPIAN

- | | |
|---------|---------|
| 80 肠炎 | 92 皮炎 |
| 83 猫烧伤 | 94 猫狂犬病 |
| 86 猫难产 | 95 猫抓病 |
| 88 猫钩虫病 | 96 猫癣 |
| 89 猫蛔虫病 | 97 猫牙周炎 |
| 91 毛球症 | 99 猫瘟热 |



名猫介绍 篇

MING MAO
JIE SHAO PIAN



短毛猫

Shorthair



美国
卷耳猫



Am
erican Curl

历史
概述

美 国卷耳猫起源于美国加利福尼亚州，但是直到1983年才开始品种选育，并成为猫世界稀有的新成员。1986年，卷耳猫在猫爱好者协会正式登记注册，并在1993年的锦标赛上开创了猫爱好者协会正式认可一个品种拥有两种被毛长度均可获得冠军的先例。

外形
特点

由 美国卷耳猫的双亲所产下的幼猫，形成卷耳的发生率只有50%。出生时，卷耳猫的外观与一般幼猫无异，出生4~7天后逐渐开始变化，形成卷耳。与外貌相符的撒娇性格，使它很受欢迎。



头部大小中等，长稍大于宽。直直的鼻子从眼到前额逐渐升高，而与前额形成平缓角度。吻部既不尖也不方平，没有髭毛线。下巴有力。耳适度地大，基部宽，尖部圆，距离大，位置高。耳软骨向后朝头顶部翻翘，翻翘程度 $90^{\circ} \sim 180^{\circ}$ 。耳内绒毛和猞猁尖为佳。美国卷耳长毛猫带棕色斑纹。眼适度大小，呈核桃形，距离宽，清澈明亮，和被毛颜色无关。颈中等粗，身体长度为肩高的1~1.5倍，骨感，肌肉既不粗糙也不细致。腿中等长度，肌肉有弹性。爪中等大小，呈圆形。尾的长度和身长相等，基部宽，逐渐向尾部变细，尾尖呈圆形。被毛两种类型：半长毛毛质细腻丝质，有稀疏的底层绒毛，没有领圈毛。短毛毛质为细腻丝质，平顺，有底层绒毛。所有的颜色都允许。不良特征：过深的鼻中断；过重和粗糙的被毛；底层绒毛过厚，颈部毛过厚；耳根低，过度卷曲，即耳尖接触耳背或头部背面。

性格

美

国卷耳猫好奇心很强，是人类很好的伴侣，适合所有家庭饲养。它性格沉稳而聪明，幼猫时的一些行为会一直保持终生。美国卷耳猫不爱叫唤，但是它们知道怎么告诉你它们需要什么，它也能与家里的其他宠物和睦相处。



苏格兰
折耳猫

Sc
ottish Fold



历史概述

据说在1961年，苏格兰一户牧羊人家里一只母猫产下了一窝幼猫，其中有一只奇怪的幼猫，它有着白色的被毛、紧扣头部的耳朵和像猫头鹰一样的脸，从此便根据出生地及耳朵下折的现象，给这个品种命名为“苏格兰折耳猫”。该品种的独特之处就在于耳朵是向下、向内卷的，很像玩具熊，所以很快便赢得了美国爱猫人士和评审员的青睐。1978年，苏格兰折耳猫荣获爱猫协会评选出的冠军。

外形特点

折耳猫是种内培育的结果，但是也允许与其他品种杂交，如美国短毛猫和英国短毛猫。折耳猫不具有美国短毛猫那种工作猫的健硕体型，也不像英国短毛猫那样个头大，它身材紧凑，腿短，扁前额。折耳猫其实是一种中等体型的猫，体型浑圆，被毛短密而有弹性。它那甜蜜的眼睛大而圆，须肉饱满，短鼻梁，面部线条圆润。苏格兰折耳猫刚出生的时候耳朵并不是折着的，大约3~4周大的时候，它们的耳朵才开始下折或者就干脆不下折，直到幼猫11~12周大的时候，繁育者才能大致判断出它们的品相（宠物级、繁育级还是比赛级）。目前，只有耳朵折下来的折耳猫才能参加比赛，当然，每个繁育者都希望繁育出能参加比赛的猫。在选购折耳猫时，一定要确认尾巴的弹性，并要检查腿和脚。腿部不能因为粗短或脚趾分开而导致厚重或缺乏弹性。要判断尾巴的弹性可以用手非常轻柔地从尾巴根部略呈拱形向尾梢捋动。如果弹性正常，这种拱形捋动不会给它带来不适。



性格

苏格兰折耳猫天生就有着糖果般甜美的性格。它们喜欢参与主人所做的任何事情，但通常只是静静地在旁观察，不会发出声音来打扰你。它们的运动天赋虽然一般，但并不表示它们不喜欢玩，只是更青睐于有主人的陪伴。苏格兰折耳猫喜欢平躺着睡觉，在无所事事的时候，它们会像水獭一样坐在那里向窗外张望。

胖乎乎的脸蛋，圆圆的眼睛，犹如从日本漫画中跳出来的可爱模样非常讨人喜欢。加之对人友善，对主人的忠心更是可以媲美狗类，当它认定你是主人以后，便会时常跟着你的脚步走。不同于一般高傲、不理世事的猫咪，苏格兰折耳猫喜欢娇滴滴地赖在你身边，绝不会喵喵地乱叫。这样可爱的小精灵，真可以说是我们家居生活的理想伙伴。

苏格兰折耳是猫猫中的“和平大使”，这是由它与世无争的性格带来的。但是，“和平”多数指的是在成年猫猫之间，处在同龄的幼猫之间是很难和平共处的。谁多吃了妈妈的奶，谁踩了谁的尾巴，谁又私自占有玩具等等，都可以成为“战争”的理由。在大多数的时间里，幼猫们除了睡觉，就是吃奶跟打架了，这时的它们看不出有丝毫绅士淑女的样子。但就像少不



更事的小孩子，活泼好动的天性是共通的，等到小折耳猫们一天天地长大，它们的性格也逐渐地稳定了下来，不仅会与其他猫猫和平相处，甚至对狗都很友好。它们贪玩，有爱心，非常珍惜家庭生活。它们生命力顽强，并且是个优秀的猎手。也许是继承了祖先看仓库的特点，苏格兰折耳猫非常能吃苦耐劳。它的外表与其温柔的性格非常吻合。

苏格兰折耳猫能适应各种环境的家庭生活，无论家里有吵闹的孩子和狗，还是单身家庭，甚至在猫展上或陌生的旅馆里都能很快地融入周边的环境，而不会感到不安。



喂养秘诀

环境：苏格兰折耳猫由于继承了远祖刻苦耐劳的性格，所以它们的适应能力比较强，对于陌生环境能够泰然处之，但是，饲养一只健康的折耳猫，也要留意天气，湿度最好维持在50%~60%，否则会很容易患上皮肤病。

饮食：同大多数猫一样，它们的肠胃也比较弱，喂养时所给的猫粮最好是固定品牌，如果需要为它们更换其他品牌的猫粮，一定要慢慢来，在换猫粮的过程中，还要特别留意它们的便便，因为突然更换猫粮很容易导致猫咪腹泻。

运动：苏格兰折耳猫十分喜欢亲近主人，所以不要让它长时间地单独留在家中，主人回家后最好能多抽时间和它们玩耍，在玩耍中，既可以与它增进感情，又能够帮助它保持健美的身材。

梳理和卫生：无论是长毛还是短毛，折耳猫的被毛都是非常厚的，所以最好每天都替它们梳理，这样可以保持被毛亮丽并且可以去除死毛；和一般猫咪一样，折耳猫也有用舌头自我清洁的习惯，定期喂食吐毛膏，可以帮助它清理肠胃中不能消化的毛球，以减少出现肠胃不适的可能；折耳猫下折的耳朵是这一品种的主要特征，同时也成为了卫生护理的重点。它们的耳朵分泌物较多，每星期用滴耳油清洁2次，帮助耳道内保持干爽，避免细菌和寄生虫的滋生，您将得到一只健康的猫咪。




Exotic Shorthair





历史概述

在 20世纪60年代的美国，以人工方式将波斯猫等长毛品种的猫与美国短毛猫、缅甸猫等交配繁殖出异国短毛猫。当初进行繁殖计划时，异国短毛猫的体形还很瘦弱，波斯猫的饲养者担心纯种波斯会被杂种化，而且有部分繁殖者甚至强烈批评它“有损纯种猫”，因而在1968年禁止交配。当然，还是有人暗暗努力，最后发现用美国短毛猫配种，可获得良好体型的幼猫。由于其披毛以外的特征完全和波斯猫一样，因此曾被昵称为“穿著睡衣的波斯猫”。集两家之大成的异国短毛猫，现在已经在各大猫展中大放异彩。该猫的历史并不长，大约在1980年才在美国真正培育成功，并获得猫协会的认可。FIFE1986年承认了异国短毛猫。该品种现在在美国已经非常普遍，在欧洲也在逐渐风行起来。

外形
特点

虎斑纹的异国短毛猫，外形几乎和卡通片里的加菲猫一模一样，有着圆滚滚的身形，头脸和眼睛也都很大，而鼻子是个小椭圆，整张脸扁扁平平的，头部和身体也长有斑纹，所以说它是现实中的加菲猫，一点也不为过。国内很多人普遍称之为“短毛波斯猫”。对于一些喜爱波斯猫，但又因忙碌而缺乏时间梳理长毛猫的饲养者来说，异国短毛猫会是一个极好的选择。

样貌酷似波斯猫的异国短毛猫，唯一与波斯猫的不同之处就是其毛质是短而厚且呈毛绒状。理想的异国短毛猫骨骼强壮，身体为短身型，短腿，胸幅宽，有宽厚的肩部，肩部到臀部宽度一致，身体中部保持丰满，背部呈水平线；肌肉有力不痴肥；眼睛大、圆、饱满，颜色鲜艳。由于泪腺较短，异国短毛猫的眼睛比别的猫更容易流眼泪，需要主人每天清洗。大而圆的头部，两眼距离较宽，脖子短而粗，短短的鼻子，鼻节高且置于两眼中间，面颊饱满。宽阔及有力的颧骨，下巴结实。耳朵小，耳朵顶端圆并向前倾斜，双耳距离宽，位于头部偏低处，适合头部圆圆的感觉。尾巴短但跟身体成比例。腿粗短而有力，前脚笔直，从后面看，后脚也是笔直的。脚掌大、圆而

且结实。前脚有5个脚趾，后脚有4个脚趾。被毛浓密、厚实、柔软、色泽艳丽，浓厚的短毛长度适中。猫有颈毛或者尾巴上有长毛可以被选为高等级。

异国短毛猫是叫声最甜美的猫猫，它的声音非常轻微，即使是在发情和暴怒的时候，它的声音也是柔和而低沉的，这与它魁伟的身躯虽然不成正比，却是许多喜爱安静的主人的福音。

同时它也是最爱流泪的猫猫，不可否认，扁扁脸的猫猫是所有猫中感情最丰富脆弱的，当你看着它对着窗外含泪凝眸的时候，千万不要以为它受了什么委屈。异国猫猫的泪腺非常短，所以总给人一副受气小媳妇的样子，这个时候，就需要主人细心为它清理，工作量不太大，每天给它用温水擦擦眼睛就好了，就可以还猫猫一双明亮漂亮的大眼睛。


性格

性格沉静，但略比波斯猫

活泼，好奇、贪玩、性情温顺，能和其他猫狗友好相处。易于相处，安静，很少发出喵喵的声音，不喜欢孤独，感情丰富，需要主人的关怀。异国短毛猫是最适合小居室饲养的猫猫，胖猫往往没有太大的活动量，如果你有心思逗它玩，它会很高兴地陪你玩一会，如果你不理它，它最爱的消遣就在在太阳里美美地睡上一觉，直到吃饭的时候才起来。

从异国猫猫招牌式的朝天鼻上就能看出它别具优雅风范，同时也丧失了攻击能力，有的异国猫猫吃饭都要主人一粒粒塞进它扁扁的嘴里，由于过惯了养尊处优的日子，野生祖先的凶悍与狂野在它的身上已然荡然无存。异国短毛猫最不满的表现，就是含着主人手指，发出含糊不清的呜噜声，原因是没吃到心爱的顶级罐头。





Br  itish Shorthair



历史
概述

英国短毛猫的祖先们可以说是“战功赫赫”，早在2000多年前的古罗马帝国时期，它们就曾跟随凯撒大帝到处征战。在战争中，它们靠着超强的捕鼠能力，保护罗马大军的粮草不被老鼠偷吃，充分保障了军需的稳定。从此，这些猫在人们心中得到了很高的地位。就在那个时候，它们被带到了英国境内，靠着极强的适应能力，逐渐演变成成为英国的土著猫。它不仅被公认为捕鼠高手，那英俊的外形也被更多人所喜爱。

到了19世纪的末期，英国的育种专家们在这些土著猫中选出最美丽的猫咪，开始了漫长的培育工作，最终这个被称为英国短毛猫的品种诞生了，并于1871年参加了伦敦的水晶宫博览会，其品种也从此开始被命名。

1901年，英国猫俱乐部成立了，那时的英国短毛猫还是体型大而结实的蓝毛品种，很像法国的卡尔特猫，后来由于它们的后代越来越像，甚至不分彼此，所以FIFE（英国最大爱猫协会）决定将这两个品种合二为一。

第二次世界大战之后，更多毛色的英国短毛猫也陆续被各国的猫会所认可，它们走进了千家万户，成为人们生活中的伴侣。

1970年后，它们的体型越来越小，毛色的种类也越来越丰富，逐渐变得优雅。到了1977年，FIFE又重新更改了规定，将这两个品种分离并且禁止继续将它们杂交。



外形特点

头

部又宽又圆，双耳间距较小，眼睛大而圆，颈子粗又短，尾巴的长度大约是身长的 $\frac{2}{3}$ 。英国短毛猫的毛色非常丰富，毛色不同，身体的其他颜色也会不同。

1. 橙眼白色猫：

在橙眼白猫中，“畸趾”发生率很高，“畸趾”即是“多趾”，虽然在展示时会被视为一个严重缺陷，但不致引起残疾，仍然是可爱的伴侣。与橙眼黑猫相比，橙眼白猫更受欢迎，因为黑色被认为是黑暗与邪恶的象征。

2. 蓝眼白色猫：

蓝眼白色英国短毛猫往往先天耳聋，没什么能力做一个好母亲且现今较为稀有。除眼睛颜色外，在其他方面和别的白色英国短毛猫相同，蓝眼睛在12周大时便开始明显。第一只蓝眼白色英国短毛猫出现于20世纪80年代早期。当时很受欢迎，常成为展示会上的优胜者。

3. 怪眼白色猫：

怪眼白色英国短毛猫是从橙眼英国短毛猫的繁殖计划中培育而成的。有一只橙眼及一只蓝眼，外貌奇特，同时有头上有深斑纹者不会患耳聋之说。

4. 乳黄色猫：

自上世纪50年代以来乳黄色猫便一直很受欢迎，但却给培育者带来严峻挑战，因为那时人们对颜色基因不甚了解，许多乳黄色英国短毛猫总是带着虎斑或带有多个浅粉红色斑，眼睛从深金色到铜色不一。最早培育出来的乳黄色长毛猫，颜色比现在的品种深得多，有些猫的颜色接近淡黄褐色。

性格

英 国短毛猫大

胆好奇，但非常温柔，适应能力也很强，不会因为环境的改变而改变，也不会乱发脾气、更不会乱吵乱叫，它只会尽量爬到比较高的地方，低着头瞪着那双圆圆的大眼睛，面带微笑地俯视着你，不用语言，只用那可爱的面部表情就抓住了你的心。

喂养秘诀

梳理与卫生：一只英国短毛猫的护理会十分简单，因为这些小家伙天生丽质，短短的被毛从不会打结，只要每天用梳子给它全身梳理一下就足够了，如果它处在脱毛期，主人可以多梳理几次。对于英国短毛猫，清洗要远远比梳理重要得多，因为它们的被毛密实又柔软，灰尘很容易待在那里。虽然猫咪们会经常用它那带刺的小舌头梳理被毛，但是并不能彻底除去底层的灰尘，所以每个月给它洗澡1~2次，可以帮助它很好地清理污垢，毛毛清洁了，猫咪自然开心。在这里，还是要提醒主人注意毛球的问题，猫咪有用舌头自我清洁的习惯，但同时也会吃下很多毛毛，所以，定期喂它吃一点吐毛球膏，可以及时清理肠道内的毛球，也可以帮助它们护理肠胃。


环境：英国短毛猫的老祖宗们给它们留下了吃苦耐劳的优良传统，这使得它们比一般的猫都要强，面对陌生的环境可以泰然处之，没有一丝恐惧。

饮食：所有的猫咪都有一个共同的特点，就是肠胃的消化功能比较弱，英国短毛猫也不例外，这主要体现在突然更换口粮的时候，主人如果换粮太突然，就会导致它腹泻，但也不需要过多的担心，只要你合理地、慢慢地让它适应新的猫粮，不要一次全部换掉，就不容易腹泻了。

运动：英国短毛猫喜欢亲近主人，但是如果你只喜欢它们乖乖地趴在你的膝盖上睡觉，那就需要注意了，因为猫咪长期不做运动就会发胖，而体型过胖的猫咪，身体状况也会出现。原因很简单，就像人一样，平时不运动，发胖了就会有好多病找上门来。所以，要有一只乖巧又健康的猫咪，你每天至少要陪它做游戏半个小时左右，这样，既可以增加你和猫咪的感情，又可以一起保持匀称的身材。



长毛猫



Long Hair Cat

喜马拉雅猫

Hi

malayan cat




历史概述

经过各种研究，英国和美国先后在

1930年后期成功地繁衍出喜马拉雅猫，但当时的品种与现今所见有很大差别，主要在于当时的品种在四肢及体型上近似暹罗（泰国的旧称）猫。后来经过重复改良后，英国于1955年确认其品种。其后，它的体型慢慢与波斯猫相接近，颜色更近于暹罗猫。之所以称之为喜马拉雅猫，是由于它和叫这个名字的兔子的长相十分相似的缘故，而和喜马拉雅山没有关联。






外形
特点

它有波斯猫的体态和长毛，暹罗猫的毛色和眼睛。它的性

情介于暹罗猫和波斯猫之间，集两者的优点于一身，便于饲养，逗人喜爱，特别适合需要精神安慰的人饲养。喜马拉雅猫的四肢肥短而直，身体很短，胸部深，它有强有力的圆顶状的头部，圆圆的脸颊和下颚，小巧的耳朵和短鼻，还有圆滚滚的大眼睛，这些几乎都和波斯猫相似。眼睛是蓝色的，而且越蓝越好。它的被毛长而柔软，有深色斑点，斑点的颜色深浅对比明显而引人注目，有海豹点、巧克力点、蓝色点、丁香点、橙色点、玳瑁点和蓝奶油点等7种色点，都很有观赏价值，这些色点分布在猫的腿、脚、尾巴、耳朵和面部。






性格

大 多数喜马拉雅猫不太活泼，也就是说，它们不会随意走动。

它们喜欢玩耍，但是它们更喜欢趴在主人腿上，而且不论主人正在做什么它们也总想参与一下。



波斯猫

Long Hair Cat



历史概述

有 关波斯猫的起源众说纷纭，现较统一

的说法是在阿富汗土著长毛猫的基础上，同土耳其或亚美尼亚地区的安哥拉猫杂交培育而成。波斯猫历史悠久，大约16世纪就经法国传入英国，18世纪被人带到意大利，19世纪由欧洲传到美国。据说维多利亚女王养了两只蓝色波斯猫，威尔士王子(爱德华七世)在猫展上对其大为褒奖，从此波斯猫的名声越来越大，公众也由此而为之倾慕。

外形特点

头 大而圆，有厚度；头盖宽，两颊鼓起；鼻短而宽，鼻梁塌；

口吻短而宽，下颌发达，厚而有力，齿为剪式或钳式咬合。从侧面看头部、额、鼻和口吻端位于一条垂直线上；从正面看则整个脸形为圆形。耳小，以耳端浑圆为佳，耳微前倾，耳根处敞开，两耳间距宽。耳基部位位置低于头盖。眼睛大而圆，稍突出，两眼间距适中，匀称。眼色因毛色而定，一般认为波斯猫的眼睛有蓝色、绿色、紫铜色、金色、琥珀色和鸳鸯眼。鸳鸯眼波斯猫的毛色常为白色。绿色、琥珀色及金色眼睛的猫，一般属于银灰毛色系。各种眼睛的颜色越纯、越深越好，并且以两只眼睛的颜色均匀为佳。波斯猫的体形为典型短胖形，全身骨胳



粗壮，前后肢同高，腿直立，肩与臀同高。趾圆大而有力，爪大，足趾间紧凑。前爪足趾为5趾，后爪足趾为4趾。尾短而圆，与身体长度成比例，向背部倾斜，但不抵背部。走路时尾不拖地，尾毛蓬松。被毛长而柔软蓬松，富有光泽，覆盖包括肩部在内的身体各处。颈背毛像绸缎般泻挂至前腿间褶皱处。耳朵上饰毛长而卷曲。趾间饰毛较长，尾毛蓬松茂密。毛质软如棉，轻如丝。波斯猫的毛色大致分五大色系，近88种毛色。其中单色系有白色、黑色、蓝色、红色、奶油色等。渐变色系有灰鼠色。忌选身体细长，颈绉长，胸部狭窄，腹侧平板；头细长；长鹰钩鼻、咬合异常；小眼睛，两眼间距窄，吊眼梢；四肢骨骼纤细，长腿，O形腿，足趾间隔大，足趾数不正常；尾长，松鼠尾，尾巴不直。

性格

波斯猫温文尔雅，反应灵敏，善解人意，少动好静，气质高贵华丽。叫声纤细动听，适应环境能力强。但夏天讨厌人抱，喜欢独自睡在地板上。

金吉拉

Chinchilla



历史概述

金 吉拉是最早纯人工育种，经过多年精心繁育而成的一个特色猫种。如今的金吉拉具有银色虎斑和烟色猫种的特点。事实上，公认的金吉拉猫的祖先已难以考证，因为它是由很多种猫种繁育出来的。但是该猫种的起源却被详细地记录了下来。所有的线索都表明该猫种的繁育其实是由一只生于1882年的名叫Chinnie的母猫培育出来的。所以“金吉拉”这个名字不知道是源于Chinnie而来的，还是因为该品种与名叫Chinchilla的南美栗鼠有某些相同之处而来。经过繁育者们不懈的努力，金吉拉猫于1894年首次作为一个独立的品种出现在英国水晶宫猫展上。

外形特点

金 吉拉分金色金吉拉和银色金吉拉。
体形大小适中，体形较短。重心较低。骨架中等大小。前肢笔直。头部呈圆形，口鼻相对较小，脸部宽阔。耳朵的顶部呈圆形，底部没有不适当展开的状况，尺寸中等，对称分开，耳内毛簇呈穗状。眼睛大而圆，呈鲜绿色或蓝绿色等各种

绿色，其中以祖母绿为上。金吉拉眼周如同埃及艳后般被纹上了浓黑的艳丽而华贵的眼线，却又给人以精灵般的印象。鼻子的长度适中，突出，而侧面看来有微小的停顿。适中的鼻翼和鼻孔，不能为塌鼻梁。下巴较为明显，柔和的轮廓，给人以微笑的印象。足掌呈圆形，结实、紧凑。尾巴与身体比例均匀，无卷曲，伸直时角度不能低于后背。金吉拉有浓密的长毛，有整圈的颈毛和毛茸茸的尾部，头部和前肢毛发较短，后肢被毛覆盖，从背后看好像穿了裤子。触感柔软如丝质般，外观光滑而蓬松。


性格

优

雅文静，温顺而有个性，它柔情似水善解人意，喜爱与人接近，训练有素的金吉拉极为听话，对主人更是亲近有加。它们的自尊心比较强，因此不要随意呵斥它们，否则它们也会因生气而疏远你甚至以绝食来抗议。它很爱清洁，它的性格特点较为适合在室内饲养，可以说是理想的乖乖猫。







饲养篇



新猫进家要不要隔离

原来觉得隔离就是防止打架，防止互相传染疾病啥的，经过实践后，现在才发现还有另外一些好处。

一般家中已成气候的猫老大是不会轻易接纳外来者的，年龄越大的猫胆子越小，这时带回来一只新猫，想当然会战火纷飞，持久不息。所以如果你将新猫带回家来，应该直接隔离在一间屋子里呆上些许时日，不要让它和别的猫见面。



隔离的好处

1. 新猫将逐渐熟悉你，在这样一个安静的空间里也会更容易彻底放下心来熟悉环境。
2. 家中原来的猫不会立刻感觉到地盘和地位受了威胁。
3. 家里原来的猫约摸知道，那关着的屋门后面还有自己的一个同类。它将逐渐从你身上熟悉新猫的气味，时间久了越觉亲切；而且想见到那只猫的欲望将会日益强烈，到了一定时候，好奇心会战胜排斥心理。
4. 新猫也逐渐从你身上熟悉了家里原来猫的气味，而且在相当信任新主人的情况下，越来越想探究隔离屋外的空间，好奇心将战胜一切恐惧。


不隔离的坏处

1. 家中原来的猫会立刻感觉到陌生的气味，感觉到主人的爱将分一部分给那个新来的家伙，从而出现相当强的戒心和敌意。
2. 新猫本来就害怕这个新环境，不完全信任新主人，加上旁边有别的猫虎视眈眈，胆子小的将坐卧不宁，胆子大的将欺压原有猫咪从而将气氛搞得更糟，就算它不是存心欺压也会被原有的猫咪误解。
3. 在猫咪之间战火密布的时候，新猫无法安然饮食休息，也无法完全建立对新主人的信任，时间久了人与猫的关系将造成恶性循环。

当然，如果你已经让新猫咪和原有的猫咪相处了一两天，无论它们之间打不吵架，打架凶不凶，隔离的这一招都起不到最佳效果。

猫粮的选择

市面上现有宠物食品繁多，品牌也多，进口的、国产的都有。在选择猫粮时有以下几点需要注意：



保证粮食质量

最好到宠物医院购买，以保证产品质量，或者超市购买。千万不要到菜市场去买，那里的猫粮的确便宜，但是原料都是植物，猫咪吃的时间长了会得心脏病或更严重的疾病。猫咪是食肉动物，原料里必须是肉和必要的营养添加剂。

选择中、高档猫粮

伟嘉和喜悦两种品牌属于低档猫粮，在猫还吃米饭拌鸡肝的日子里，曾经被许多养猫人称之为贵族粮食的这两款猫粮早已经是过去的事情了。现在，随着人们的需求提高，更多高档的猫粮进入中国市场，在喂养纯种猫时，最好选择中、高档猫粮。

选择罐头搭配猫粮一起喂养

日常给它一些磨牙的干粮，吃罐头，这样对猫咪的牙齿就不会造成伤害。而且事实证明，罐头中确实含有猫咪需要的蛋白质。猫的身体与人类不同，它馋嘴是因为它每日的蛋白质需要量是人类的5倍以上，所以猫爱吃肉只是维持它正常生命代谢的本能反应。

猫粮换品牌要慎重

选择好了适合自己猫咪的猫粮后就不要再换品牌，即使非要换，也要逐渐地换掉。采用与旧食物掺在一起的方式，逐日加大新食物的分量来达到换食的目的。换食频繁容易引起猫咪肠胃不适。

各种猫粮的特点



猫粮以鱼肉为主，所以有点贵，如果出于营养考虑，肯定会支出太多，所以，要善于利用猫粮。猫粮大致可分为干性、罐头、半生熟3种。

干性食品是里头含有必需营养素的综合营养食品。味道有牛肉味、鸡肉味、鱼味，每种都很脆，有嚼头。这种食品既可锻炼牙床，价格又便宜，且易于保存。所以，可能的话就尽量以这种食物为主。注意喂的时候要加上足够的水。

虾、鱼等高级原料做成的罐头，种类繁多、易于挑选、味道可口，所以比干性食品更受猫的欢迎，但并非含有全部的营养素，所以和干性食品混用较好。罐头便于长期保存，但要注意开启后很容易变质。

半生熟的食品介于干性食品和罐头食品之间，适合老猫食用。





教你选猫沙

现在市场上销售的猫沙多种多样，选择一种自家猫咪喜欢又比较环保的猫沙，对于猫咪的身心健康都非常重要。千万不要忽视这小小的沙子，它陪伴着猫咪的每一天，有时候决定了猫咪的喜怒哀乐。

膨润土猫沙很适合在家庭使用，你可以随时清理猫咪的粪便，但是粉尘比较大，所以最好把猫沙盆放在通风比较好的地方。如果猫咪误食含膨润土的猫沙，会损害它的呼吸和消化系统，所以要特别注意。

木屑和纸屑猫沙因其比较天然，化学成分少，所以相对来说对猫咪身体和家里环境都好得多，虽推荐使用，但缺点是价格稍贵。

目前市场上的猫沙种类

1. 结团型猫沙：

主要成分：膨润土。

外观：白色或灰白色的小颗粒。有的品牌是圆球形的颗粒，也有的品牌是不规则形状的颗粒。

使用方法：强吸湿性的猫沙能很快吸干粪便里的水分，结成一个大硬团。在清理猫沙时，用带漏孔的猫沙铲铲出这些大大小小的硬团扔掉就可以了。随着猫沙的消耗，主人可以随时往猫沙盆里添加新的猫沙。

优点：对猫咪来说，这种猫沙比较轻，脚感比较好，适合天性喜欢掩埋的猫咪。清理起来比较方便。此外，这种品牌的猫沙在吸臭方面做得比较好，如果家里猫咪数量不多，每天清理猫沙，基本可以做到无味。

缺点：粉尘偏大，如果猫沙盆摆在房间里，家具表面会逐渐附着一层细细的白色粉末，猫身上也有一股土腥味。因为猫沙颗粒很细小，比较容易卡在猫咪的脚趾缝中，猫咪便后会将残留在脚趾缝里的小沙粒舔食掉。

2. 木粉猫沙：

主要成分：这种猫沙产品是以回收松木、纸浆或小麦副产品为原料，属于比较环保的猫沙产品。





优点：这种猫沙采用木屑为主要原料，辅以少量天然黏结剂造粒制成，没有粉尘或粉尘很小，不会造成空气的污染，而且防渗透的能力非常强，具有比较好的结团和吸味功能。由于它的吸附能力较强，因而比膨润土材质的猫沙消耗量更小，更适合家庭使用。

缺点：有能力生产这种环保型猫沙的厂家国内似乎还不太多，所以我们在目前的市场上还比较难买到，一般在网上订购。

3. 纸屑猫沙：

主要成分：一部分纸屑猫沙内含有活性炭，有些是用废旧的新闻纸经过处理制成的。

优点：纸屑猫沙属于软性沙，像米粒一样大小。在除臭方面，纸屑猫沙由于颗粒大小、硬度与一般矿沙差不多，所以不容易有臭味散出。现在市场上销售的纸屑猫沙内一般都含有活性炭，对除臭也有帮助。纸屑猫沙由于颗粒比较小，因此用量较小，虽然没有结块，但尿湿后会呈灰色，很容易辨认，方便清除。而且可以倒入马桶冲掉，比较简便。

缺点：纸屑猫沙的凝结力稍稍弱一些，有一些纸屑猫沙在使用的时候可以凝结，但会变成一团糊状。

幼猫所需用品



猫床

幼猫最需要一个属于它自己的温暖安全的睡床。同时猫窝要便于清扫，为了简便，一只纸箱里铺上干净的垫子，也可以成为猫咪舒适的窝。

喂食器具

猫咪的餐盆不要太深，应不易踢翻，便于清洗。请您把它的餐盆放在离猫窝较近的地方，并不要打扰猫咪进食。



便盆

请为猫咪准备一个便盆，并把它放在远离猫咪食宿的地方。便盆需每天清洗，因为生性爱干净的猫咪，会拒绝使用不洁的便盆。为了让猫咪能与人和谐、快乐、干净地生活在一起，建议您使用猫沙，来保持猫咪的卫生和您室内环境的清洁。由于天然粘土吸水后可迅速聚团，极易清除；还对控制异味有特别效果，使用时间长，又经济实惠，您不妨试试。

梳理用品

所有的猫咪，尤其是长毛猫，在很小的时候就应训练它们习惯于主人为它梳洗打扮。

颈圈

给您的猫咪戴上一个漂亮的颈圈，它既是一个很好的装饰，又是一个识别标记。一旦猫咪不慎丢失，颈圈将会发挥它的作用。

玩具

猫咪天性好动，给它一些简单的玩具、看着它蹦跳嬉戏的可爱样子，您一定也开心极了。但要小心，防止猫咪把玩具吞到肚子里。

以上提到的猫咪使用的物品，都可以从商店、超市宠物用品柜台、宠物医院或宠物用品店中买到。

幼猫

断奶期的喂饲注意事项



很多情况下，猫粮提供的营养是全面合理的，但断奶期的幼猫可能需要更多的营养。很多人不知道如何给断奶期的幼猫增加更多更充分的营养，身边经常有猫友问这样的问题。

幼猫一般在出生25天左右会自己学着吃东西，通常它们最先接触到的是妈妈的食物。如果妈妈吃的是幼猫粮食就无所谓了，如果妈妈吃的是成年猫粮，我们就需把粮食放在相对高点的地方。也有细心的主人会给幼猫准备其他的食物，这个时候需要注意，什么可以给幼猫什么不可以给。我们可以把幼猫粮弄成糊状的给幼猫，这个期间我们也可以喂幼猫吃点猫奶粉。无论是喂幼猫粮食弄成的糊状食物还是猫奶粉，喂的量要掌握好。可以以5毫升做为一个增加或减少的量，早晚各喂一次，并观察幼猫的排便情况，如有不适就要停止喂食。

有的主人在这期间会喂小孩吃的东西（奶粉、婴儿粉或肉泥），这些是不可以的，因为猫的消化系统与吸收系统与人有所不同，吃人的食物可能会引起腹泻或其他健康问题。在辅助喂食3~5天后，可让幼猫自己吃糊状幼猫粮或猫奶粉。在30天左右可停止喂食糊状食物，让幼猫自己学吃干的或半干（用温水或猫奶粉泡一下）的猫粮，逐渐增加食物的硬度。在幼猫自己完全学会吃粮食后，可以适当的补充一些肉类或其他钙质类的营养。要注意确定是幼猫用的，不要輕易喂食成年猫用的东西，因为幼猫肠道比较敏感。

让猫咪安全地吃鱼

人们都会认为猫吃鱼是天经地义的事情，哪个猫儿不吃腥，难道这也会有什么道理么？其实，对于猫吃鱼这个问题，其中也有一些小小的学问。如果忽略这些问题，就很可能给您的爱猫带来一些本不应该得的疾病。

鱼的种类有很多，在这里我们将它分为淡水鱼和海水鱼两大类。

淡水鱼对猫咪来说是一种较理想的食物。虽然它们大多有很多细刺，但并不会对猫的消化道造成太大的威胁，因为绝大多数的细刺会被猫舌头上的倒刺理顺，然后才被咽下，在胃中消化。用淡水鱼喂猫唯一需要注意的是一定要将鱼煮熟，不能让猫食入生鱼，尤其是在烹饪过程中丢弃的鱼头、鱼鳃和内脏等部分，更不要随手丢给您的猫咪，因为在淡水鱼中，特别是在自然水域和老池塘中养的鱼可能会有一种可怕的寄生虫——华支睾吸虫。如果猫在食入生淡水鱼时被感染的话，成虫就会寄生于猫的肝脏中，引起肝脏组织病变。被感染的猫咪会在发病初期出现厌食、精神忧郁，继而出现黄疸症状：呕吐、消瘦，有时

伴有体温升高。如果这时主人粗心大意，没有及时发现而延误病情的话，就有可能危及猫咪的生命。

给猫吃海水鱼，一般应注意3点：

第一，海水鱼一般都有坚硬粗大的鱼刺，尤其是人们经常食用的带鱼和黄花鱼，这些鱼刺对猫儿来讲是很难嚼碎吞下的，如果主刺被逆向吞入口中，就很可能卡在咽喉很难取出。所以在给猫饲喂海水鱼时，一定要剔除鱼刺。

第二，有些猫会因为自身体质的因素而经常出现尿道结石。海水鱼中含有的大量镁盐，会在猫的尿道中形成结石。所以有尿道结石病史或遗传史的猫应尽量减少食用海水鱼。

第三，海水鱼中含有大量的硫胺素酶，能分解食物和肌体中的硫胺素，如果长期以海水鱼为主食的话，可造成猫的维生素B缺乏症，引起颈椎疼痛、颈部不能抬起等症状。

所以在饲喂猫咪的时候，无论是淡水鱼还是海水鱼都应该注意其新鲜程度。因为鱼肉中含有丰富的蛋白质，一旦变质，就会产生大量的组胺类物质，即使喂前主人已将鱼尽可能煮熟，但是组胺的成分也是不会被破坏的。猫咪食入这样的鱼肉后可能会引起一系列的过敏反应，比如腹泻、呕吐、耳及躯干部瘙痒、耳壳及眼周围出现红疹，有时还会引起被毛脱落。这些疾病的病程有长有短，严重的可能持续1个月的时间，所以主人应该尽量注意，以免引起不必要的麻烦。



不能

让猫吃的东西





出于对猫的健康考虑，请记住不能喂给它们的食物，特别是些迷信的未经科学验证的食物，没有必要特意给幼猫吃，如吃生鱼肉猫会长得更好。有时主人很注意，但家里淘气的小孩子会喂，所以全家都得小心。



洋葱

洋葱含有破坏猫的红细胞的成分，虽说主人一般不会单独喂洋葱，但注意不要混在肉中喂。

鱼骨、鸡骨

有人以为猫能好好地嚼碎骨头，实际上猫不嚼食物而是吞下去。大骨头会有刺伤胃的危险，还是除掉比较放心。

甜点

有的主人因为好玩而给猫喂蛋糕、巧可力，并认为似乎是无关紧要的事，但经常喂这些东西的话，猫容易养成吃甜食的习惯，会长蛀牙、发胖，从而引发一些疾病，应避免这类事情。

生猪肉

因为生猪肉可能有弓形虫等寄生虫，所以一定不能喂。

墨鱼、章鱼

坊间传说吃了墨鱼、章鱼腰节骨会软，实际怎么样不清楚，但因为不易消化，所以不能喂食，更不能作为常吃的食物。

不可喂鲍鱼、海螺等海产品，这些会使猫得光线过敏症和使其耳朵易得皮炎，尤其对薄的耳朵更有影响。

猫咪换食有学问



许多猫主人喜欢用家常饭菜喂养猫咪，殊不知家常鱼、肉中含量过多的脂肪，容易导致猫咪脂肪发炎、浑身疼痛，而家制鸡肝中过多的维生素A则容易使猫咪得关节炎。所以，为了使猫咪更加健康成长，引导猫咪换食专业猫粮就显得非常重要。

科学研究表明，宠物从一种食物转换到另一种食物，需要一段转换时间。宠物专家建议：刚开始换食时可将少量猫粮与现有食物混在一起饲喂，以后每餐逐步增加猫粮的分量，减少原来食物的分量，3~7天后，猫咪就可以完全适应专业猫粮了。或者也可将干猫粮稍稍用温水润湿，使其变得松软可口，散发出鱼和肉的香味，这对猫咪会更具吸引力。还可以将猫粮罐头与干猫粮搭配，均匀地搅拌起来，这也是有效的猫咪换食技巧之一。对于1岁以下的幼猫，则应该选择幼猫猫粮。4~9周的幼猫，可用1份温水兑3份幼猫干粮来喂食；对于10~12周的幼猫，它的牙齿已发育好，可以相应减少兑水量。此外，多口味的调味剂对爱猫尽快适应猫粮也是有效的。



不同年龄猫咪的喂饲方法

幼猫

营养均衡的饮食对幼猫的健康活泼成长非常重要。它的食物中必须含有充足的蛋白质、脂肪、维生素以及矿物质，并且这些营养物质应按一定比例搭配。

如果幼猫刚刚断奶，则需每天为其喂饲4~5次。喂饲次数可逐渐减少，6个月龄且体重已长到成猫的3/4时可以将喂饲次数减少到每天2次。幼猫长得很快，所以它们的食量也会增加，应相应增加喂饲量。由于猫一般不会超量进食，所以可以每餐它需要多少就喂饲多少。根据经验，可以给它20~30分钟的进食时间，而后将剩下的食物倒掉。公猫比母猫吃得多，长得快，而且成年后体重要比母猫重。猫到8~9个月龄时就可逐渐喂饲成猫粮了。这一逐渐适应的过程最好为1周，这样它就可以完全适应成年猫粮了。

成猫

不同的猫根据它们不同的体形大小、活动量和身体状况的不同食量也不同。大多数猫可以控制自己的进食量，如果食物中营养均衡，那么它们就会进食适量。除非您的猫太过肥胖，否则您没有必要限制它的食量。


老猫

猫到了老年，活动量会减少，应减少喂饲量以防止它肥胖。肥胖的猫会感到不适、急躁，并易得一些严重的疾病，例如糖尿病。肥胖会使它难以为自己梳理毛发进而导致皮肤疾病。而有些猫到了老年后消化系统功能衰退了。它们可能不能吸收食物中的全部养分，进而身体偏瘦，这些猫应少食多餐。

处于繁殖期的母猫

同其他怀孕的动物不同，母猫成功交配后1周内就开始食量大增，并且体重增加，而其他动物的体重增长主要集中在怀孕期的后1/4时期。母猫之所以这样是因为它们要在身体内积蓄能量以备怀孕及哺乳期间使用，而在怀孕和哺乳期的进食很难满足这一需求。在9周怀孕期的最后2周，它会吃相当于平时2倍的食物。食物应可口，这样它才会吃足够的食物以满足自身的需求。到哺乳期的第5或第6周，母猫需要的食物是交配前的3倍。

在幼猫断奶前对母猫应保持这一食物供应量，然后逐渐减少喂饲量直至正常。可以通过观察母猫的体重变化来调整喂饲量。



怎样准备猫窝



对家庭养猫者来说，在买猫之前就应该准备好猫窝等猫日常生活用品。一般宠物商店均可买到这些日常生活用品，也可主人自己动手，因陋就简地解决。

猫窝是猫住和睡觉的地方，有了猫窝，猫才不会在屋内随便地这里钻钻、那里卧卧，冷暖无常，既不卫生，也不利于猫的生长。

猫窝可用小木箱、篮子、藤筐、塑料盆、硬纸箱做成。猫窝的内外面及边缘必须光滑、无尖锐硬物，以免损伤猫的皮肤。猫窝以塑料、木、藤制品为好，这样便于清洗和消毒。在猫窝底垫以废报纸、柔软垫草，上面再铺上旧毛巾或旧床单等，使猫窝既温暖又舒适。饲养过程中应该经常更换猫窝的铺垫物，并将换出的脏物清洗干净。

猫窝应放在房间干燥、僻静、不引人注意的地方。猫窝最好能照到阳光，不宜放在阴冷潮湿处。此外，猫窝要高出地面，这样既能保持干燥、清洁，又便于通风和保持凉爽的环境。



猫的春季管理



冬去春来，一年四季之中由于光照、温度的相应变化，猫的生理活动和行为表现也随之呈现出一定的差异。为此，在猫的饲养管理上亦应根据四季中的这些变化，采取相应的措施，合理地护理好猫，才能保证猫健康成长。

春季是猫求偶交配进行繁殖的最佳季节。公猫、母猫均频频外出活动，四处游荡以择佳偶。发情的母猫会表现出不安情绪，或者食欲减退，有的卧地打滚，夜间发出比平时大的鸣叫声，俗称“猫叫春”，以招至公猫。平时关养在家的猫此时也往往容易走失，并容易发生一些意外的伤害。公猫为争夺母猫，常常发生斗殴而致伤。由此，在春季应加强对猫的看管，防止猫外逃。为把握好猫的这一季节，满足猫求偶欲望，养猫者应帮助猫寻找配偶，进行有目的的选配。这样既可避免猫外逃走失、防止伤害，又能根据养猫者的意愿获得较理想的后代。

风和日暖的春季也是猫换毛的季节。猫脱去冬季覆于全身的较厚实的冬毛，换上较为稀疏的薄的春毛。加之气温渐暖，猫的皮肤毛孔开张，此时应经常给猫梳理，注意保持猫被毛、皮肤的清洁。否则，各种微生物、体外寄生虫就会在猫的皮肤上孳生繁殖，引起皮肤瘙痒和炎症。此外，猫自行脱落的被毛、皮屑散落于床、沙发、衣被、地毯上，会造成主人居室环境不洁。





寄养注意事项

猫不是一个好的旅行者，最好不要把猫带到陌生的环境里。有的猫到了新环境下很难适应，会不吃不喝藏起来，那样的话对猫和主人来说都是非常不好的。但是猫独自在熟悉的环境下也是可以把自已照顾地很好的。

要是不超过3天的话，可以让猫独自在家。备好粮食和水，分成好几份比较好。准备2个厕所，这样猫应该可以自已在家快乐地生活了。

主人短期外出（如1周之内），可以把它放在家里，找朋友每天或隔天来喂1次食、水，处理一下猫沙就可以了。给它够多的玩具，它可以很快乐地在家里待一段时间。

如果实在没有办法必须送走的话，最好送到和猫比较熟悉的人家里去，才不会让猫恐惧，也不会因为你的猫给人家带来不必要的麻烦。





让猫

独自在家注意事项



正确处理新老成员的关系

要注意猫前辈的醋意，原来养着一只猫，想再养一只的时候，要注意两只猫之间的关系。猫表面看起来很冷静，但实际上醋意很大。当它看见主人溺爱新到的幼猫，便会醋意大发，蓄意攻击新宠。很多时候，新宠多为幼猫咪，主人抱着幼猫咪，对猫前辈说：“这是幼猫咪，多多照顾它哟。”以为这样就会平安无事，其实猫前辈却早已闷闷不乐。猫本来就不合群，喜欢单独行动，新猫咪的到来会让它觉得它的势力范围遭到侵犯，便会下意识地进行反抗，有的甚至会离家出走。

为了避免日后的纷争，唯一的方法是给猫前辈面子。想想姜还是老的辣嘛，所以要模仿猫咪的声音和猫前辈打招呼，然后抱抱它，表明你还是很爱它，这很重要，这样一来，猫前辈才会安心。让猫见面时可以抱着猫前辈。还有把猫前辈小便涂到新来的幼猫咪的屁股上，就等于猫前辈认可了这个新伙伴，纷争就会减少。

保持猫厕所的整洁

厕所要保持清洁，至少1天打扫1次。给猫准备了厕所，它却不愿意上时，就应考虑是否猫不喜欢那个厕所，不是光设置了厕所就行。如果家里养的是幼猫咪时，厕所太脏不好用，猫咪会不乐意光顾厕所。还有对于爱清洁的猫来说，难以忍受被粪便弄脏的厕所，所以要好好清扫厕所，最好每次便后立刻打扫。如果不行的话，至少1天打扫1次，厕所的沙子要经常换，整个厕所也要经常清洁。

厕所要设置在既能令猫安心，又安静的地方，猫是不喜欢生活有改变的动物，所以主人不能任意变动厕所的位置。要是常换的话猫就很难安心地方便，如果要换地方的话也要逐渐换，让猫适应。厕所不宜设在像起居室、走廊等热闹的地方，要保证安静。

如果训练失败，重要的是迅速清除那儿的气味，猫有一习惯就是某地一旦沾有自己排泄物的气味就会多次去那儿排泄，因此猫在厕所以外的地方排泄了的话，注意用水或洗涤剂洗掉上面的气味，如果仍留有气味的话，它还会去的，那样就无论如何也养不成好习惯，因此清洗时可以使用毛刷或消臭剂。



老猫

该如何照料

营养

老猫的代谢速率较慢，因此对于能量的需求较少，如果猫主人仍喂给其幼猫或成猫饲料，或者猫罐头，就很可能造成老猫痴呆肥胖的现象。另外，老猫也没有足够的能力来代谢或排泄过多的蛋白质代谢物，应降低食物中脂肪的含量，以限制热量的摄取，但给予的脂肪应该是容易消化，且富含必需脂肪酸，以弥补老猫较差的消化吸收功能；食物中还需添加少量的纤维素。

控制热量的摄取，也可以增进肠道的功能。老猫应该适度地增加维生素A、B₁、B₂、B₁₂及E的摄取，应稍微限制磷的摄取，以减少肾脏的负担。

很多人认为老猫仅需喂予减少份量的成猫饲料，其实这是相当不适当的，因为老猫需要更多的添加营养素，如维生素、微量元素以及牛胆素等，所以如果单纯以减少分量的成猫饲料来喂予老猫，虽然可以达到限制蛋白质及脂肪的目的，但是却会造成某些营养素的缺乏，因此最好选择特别为老猫设计的老猫饲料。而老猫的嗅觉及味觉都会变得不够敏锐，因此这种饲料必需是高品质、富含所有营养素及口味佳的饲料，喂食的方式最好采取少量多餐，以弥补不足的消化吸收功能。突然地更换饲料常常会引起老猫呕吐及下痢，充足新鲜的饮水更是必需的。



一般照料

牙齿保健对于老年动物特别重要，猫特别无法忍受口腔的疼痛及疾患，会导致食欲废绝、渴感缺乏、脱水以及嗜眠，一旦经由兽医治疗处理之后，畜主也必须在家进行日常的口腔保健，以防止病情的再发，或至少能加以控制；主人可经由兽医推荐来采用不同的方法，如使用犬猫专用牙刷、牙膏等产品，并给予干饲料。老猫更应该每日定时刷毛，不但有助于皮毛的健康，也有助于防范异常行为的发生。很多人认为老猫不需要每年定期的预防注射，这是相当错误的观念，因为免疫能力会随着年龄而日益下降，因此每年的预防注射是必需的。



怎样喂养流浪新生幼猫

发现流浪新生幼猫怎么办

当你发现流浪新生幼猫时，它们往往体温很低，可能会一直不停地哭叫或出现脱水症状。如果是这样，你需要马上做以下一些工作：

1. 尝试刺激它的腹部帮助它排便，幼猫可能因为憋大小便而痛苦，而且憋久了对身体有害。最起码应该试图刺激它排尿。
2. 慢慢把幼猫暖和过来，最好用自己的体温，而不是热水袋、电吹风等。
3. 每小时给它喂一点5%~10%的葡萄糖水，每100克体重喂2毫升。
4. 不要喂体温过低的幼猫吃奶，因为此时它的肠胃停止工作了，喂它吃奶会让它胀气死亡。

接下去是要考虑长期喂养的问题，最好的办法是帮它找个猫养母。但在把流浪新生幼猫跟另一窝幼猫放在一起之前，要先确定它没有致命的传染病。不过，猫妈妈也不能喂养太多只幼猫，太多的幼猫会让母猫的营养跟不上。一般来说，自己的幼猫在2周以下的猫妈妈比较愿意养育流浪新生幼猫。过了2周，猫妈妈可能就不情愿了，而且可能会因为幼猫大小相差太大，小的猫被其他大一点的猫推挤或压在身子底下，猫养母往往是很难照顾周到，这时就需要人工喂养。孤儿猫很脆弱，喂养它们要投入很多精力，需要精心的护理。



下面是关于如何人工喂养流浪新生幼猫的一些详细说明：

1. 猫奶粉的调制：

使用推荐的猫奶替代品——猫奶粉，这些猫奶粉是按照幼猫正常成长所需能量配制的，要按照指示喂给所需的量。所有冲好的奶要在热水里加热到 $35^{\circ}\text{C}\sim 38^{\circ}\text{C}$ 再喂给幼猫。如果用微波炉，热好后要好好摇动奶瓶，因为微波炉加热不匀，会产生热点，如果幼猫喝到烫的那点奶，会被烫伤。想知道奶的温度是否合适，可以滴一滴在你的手腕内侧，如果不太感觉得到或感到微温，温度就是合适的。

如果一时买不到猫奶粉，可以暂时使用以下配方的替代品：

180毫升全脂牛奶（山羊奶更好）；
2个蛋黄（不要蛋白）；
1/2茶匙植物油；
1滴儿童维生素；
充分搅拌用热水加热到 $35^{\circ}\text{C}\sim 38^{\circ}\text{C}$ 。

2. 教幼猫从盆里喝水:

在幼猫四五个星期大时,它们应该可以自己从水盆里喝水了。给它们提供一个矮的但重的碟子,让幼猫可以站在里面而不至于把碟子弄翻。尽量把碟子放在角落里,并与食盆保持一段距离。开始时可以用手指蘸水涂在它的鼻子上,并领它去放水盆的地方,因为此时它已经开始从盆里吃东西了,所以应该能很快学会从盆里喝水。

3. 喂奶方式:

不管你采用哪种方式喂奶,最重要的是不要让奶流到幼猫的肺里。可参考以下几种方式喂饲幼猫。


(1) 用勺喂:这种喂奶方式很慢,需要很多耐心,每次要把勺里的奶慢慢倒进幼猫的嘴,不能倒得太快了,不能把幼猫的头抬得太高,免得奶流到幼猫肺里。新生的幼猫没有发育完好,奶喂到肺里时不会马上出现难过、咳嗽的表现,所以要格外小心。

(2) 用注射针管滴奶:这种方式类似用勺喂的方式,适用于身体虚弱,不会自己吸吮的幼猫,喂食起来比较干净,也比较快。在针管里装上定量的奶,放在猫的嘴巴里,每次滴一滴,让幼猫可以从容咽下去而不至于被呛到。如果幼猫知道奶是从这里出来的,它可能会开始吸吮针管的头,自己把奶吸出来。这时,你最好能换用奶瓶喂它。

(3) 用奶瓶喂奶:健康、会吸奶的幼猫喜欢用奶瓶,这也是比较自然的喂养方式。奶头上孔的大小很重要,最好自己剪一个孔,孔的大小以把奶瓶颠倒过来,每次只有一滴奶滴下来为宜。如果孔太大,奶从孔里接连流出来,会让幼猫呼吸时吸到肺里。如果需要把奶瓶挤一下才能让奶流出来,孔则太小了,这样会让幼猫吃得很辛苦,而且吃不够量。

(4) 导食管喂:这种方法是最容易、最干净、最快速的,但也需要合适的工具和熟练的技巧。如果幼猫非常虚弱,有时就只能这么去喂。

每次喂完奶,最好用温的湿纸巾把幼猫的嘴擦一擦,把漏出来的奶水擦掉。一次不要喂太多,尤其是在开始的时候。



4. 猫粮：猫咪要吃奶吃到4周。可以从第4周把猫奶和一点猫粮罐头混在一起放在浅盘里，加热到微温（如果用微波炉加热的话，只需要几秒钟，但加热后要搅拌均匀，因为微波炉加热不匀），让它们尝试并习惯猫罐头的味道，慢慢它们就从盆里吃食了。逐渐减少猫奶增加猫罐头。1周后，你可以往盆里加用温水泡软的干的幼猫粮，并逐渐停止往碗里加猫奶，减少奶瓶里的猫奶，直到没有。到幼猫6周大时，它们应该自己吃幼猫粮并从碗里喝水。这个过程要循序渐进，不要太着急。

体重的测量

一个精确到“克”的食品秤很有用，可以用来每天称称幼猫的体重，以保证它们在健康成长。幼猫的出生时体重大概在90~120克之间，在第1到第2周之间体重应该会增加到出生体重的2倍，在第3和第4周时应该会到出生体重的3倍。每天应该增重10~13克。

生长数据可参考以下这个表格：

幼年	理想温度	喂奶量	理想体重
0~1周	29.4℃~32.26℃	每100克体重喂13~15毫升	90~120克
1~2周	26.7℃~29.45℃	每100克体重喂15~18毫升	170~230克
2~3周	23.9℃~26.74℃	每100克体重喂20毫升	300~350克
3~4周	21.1℃~23.93℃	每100克体重喂20毫升并开始吃猫粮	350~400克
4周以上	21.1℃~ 30℃	主要吃猫粮	



猫

咪

盛夏洗澡注意事项



每年盛夏，主人大都会选择剪掉爱宠全身烦恼丝，只有这种清凉的造型，才能让宠物避开炎热的夏天的“特产”——跳蚤及壁虱的危害；这种造型才不会增加主人为宠物洗澡的麻烦。夏季多久为宠物洗一次澡才恰当？宠物洗澡次数过多，化学成分会破坏宠物皮肤的保护效果，可能导致各种皮肤病变，如果不常洗澡，不仅容易发臭，对于跳蚤及壁虱的感染也无法及早察觉，如何兼顾宠物卫生及避免跳蚤及壁虱的危害呢？

1. 依据宠物的活动内容及居住环境，请选择适当的洗澡频率及慎选适宜的宠物专用洗毛精。

2. 如果宠物有出现皮肤病变，请立即就医并选择具有疗效的洗毛精对症下药。



用

温

水给猫咪洗眼



猫咪眼中常会出现一些分泌物，如果置之不理的话，就会在眼周围形成“泪疙瘩”，有时还会使毛色发生变化，所以要经常清理。用棉球或纱布蘸上温水轻点眼部，将分泌物软化后用拧干的棉球轻轻擦掉。猫的眼睛很敏感，不能因为有眼屎就给它用人的眼药水。

另外，硼酸水可能会引起发炎，使用时必须注意。有的品种，像波斯猫，由于泪眼，眼周围极易弄脏。但是如果除了眼屎外还伴有发烧、食欲不振、精神萎靡等症状时则可能是生病了，必须马上送医院。

此外，如果猫咪眼屎过多，使得眼睛都几乎睁不开的话，还是尽快送医院为妥。



适当为猫咪清理耳朵

平时，猫咪只需晃晃耳朵就能自然地将里面的耳垢和水分清除，所以主人不必经常为其清理耳朵。当耳朵里面很脏时，把棉棒在婴儿化妆油里浸一下，在可视范围内清理耳内污垢。另外，洗完澡以后一定要把耳中的残留水分弄干净。但如果将耳朵中的脂肪全部清除的话，耳朵便失去了对细菌和灰尘的抵抗力，很容易生病，所以也不能过分地清理耳朵。也有猫很讨厌清理耳朵，应对这种猫的诀窍是：用一只手叉开五指成扇形捏住耳廓，干净利落地清理完。脾气暴躁的猫拿毛巾包上后再清理比较安全。如果耳朵里出现黑色污垢，就有可能得了耳壁虱（耳疥癣）或是耳炎，要送医院。



猫咪也要刷牙



现在的猫吃的多是罐头之类柔软且有水分的食物，很容易长牙垢。从2~3岁时就开始长。长此下去，就会发展成牙龈炎、牙周、牙根炎，不久牙齿就会脱落。为避免发生这种情况，1年要去医院清理1~2次牙垢。但清除牙垢，会对牙齿造成轻度损伤，以后反而更易长牙垢，所以预防才是最重要的。猫成年后，对于人试图把手指伸进嘴里为其清除牙垢是非常讨厌的，所以从小让猫咪养成刷牙的习惯，以后就容易照顾了。

猫咪一断奶就要开始训练拿手指抚弄它的牙。习惯之后，再在手指上缠上纱布为其擦拭牙齿，也可以用专为猫咪准备的牙刷。只要每周定期刷1次牙，就能防止牙垢。吃饭时喂它一些干硬的食物，饭后喝点水，也可起到预防的作用。





长毛猫的梳理

梳理长毛猫

在野生动物世界里，长毛的猫科动物一般只在冬天换毛，但是家猫由于终年被饲养在明亮和温暖的环境中，它们一整年都会换毛。因此，长毛猫需要每天梳理被毛2次，每次15~30分钟。否则毛就会缠结。如果不及时处理缠结的毛球，猫会十分疼痛，那么您就得找兽医给猫服用麻醉剂，然后将缠结的毛剃去。这样不仅猫会受苦，花费也比较大。

梳理用品

在开始给猫梳理之前，可趁此机会检查猫的眼、耳、口腔、爪，看看是否干净，有无疾病的症状。您需要一把稀齿密齿两用梳、一把猫用鬃毛钢丝两用刷和一把牙刷；还要一把钝头剪子，用来剪开缠结的毛，及擦到毛里的月桂油促进剂（深色猫用）和爽身粉（浅色猫用）。参加展览的猫，还要有用来刷猫尾的修饰刷。

梳理的方法

1. 用稀齿梳子清除皮屑，梳理缠结的毛。一旦梳子能顺畅地梳通毛，就改用密齿梳子进行梳理。
2. 用钢丝刷，清理猫咪所有脱落的毛。要特别认真梳理臀部，在这个部位，很可能会梳掉一大把毛。
3. 往毛里洒些爽身粉或漂白土，这样可使被毛蓬松，增加丰满感，而且有助于毛分开，要立即将粉刷掉。
4. 用密齿梳子向上梳毛，把颈部周围脱落的毛梳掉，以便形成颈毛。
5. 用一把牙刷轻轻地梳理猫脸部的短毛。当心别靠猫眼睛太近。
6. 最后，用稀齿梳子重复第4个步骤，以便于毛分开，并有助于毛竖起来。对于参加展览的猫，用修饰刷使尾部的毛蓬松光滑。

怎

样

护理患病的猫猫

猫的耐受性比较强，在发生疾病时，往往会躲到阴暗的角落，保持沉默，这就要求主人应时时的关心。当发现猫有异常表现时，应请兽医治疗，不要给猫胡乱喂药，以防引起副作用。

对病猫应进行隔离，以防止疾病的传染。一旦确认猫有人畜共患病（如狂犬病）且无法治愈，应将猫处死并深埋，并将用具用0.5%过氧乙酸溶液或用2%的火碱溶液进行消毒，窝里的垫料等应烧掉。

对于病猫，应让它呆在安静、舒适的地方休息，减少消耗，保持体力，以增强对疾病的抵抗力。病猫往往不吃不喝，还常常出现呕吐、腹泻，丧失大量水分，引起脱水，如不能及时补充，会导致体内的电解质紊乱，酸碱失去平衡，发生酸中毒、心力衰竭等现象，严重时可导致死亡，因此必须给猫补充水分。可自己配糖盐水（100毫升水中加入0.9克食盐、5克葡萄糖）进行灌服，每天3~4次，每千克体重每次约喂5~10毫升，或直接购买口服补液盐，根据说明使用。病猫食欲下降、消化不良，可喂一些易消化的食物，如米汤牛奶，和营养丰富的食物，如熟肉、熟鱼等，以刺激食欲、补充营养。

病猫往往精神不振、行动迟缓、被毛杂乱、眼屎增多，病重时，粪便也随处乱拉，这时应经常给猫梳理被毛，擦洗身体，以保持清洁。

如发生烧伤，应将烧伤处用湿毛巾包好，送兽医处治疗。如发生骨折，应用细木棍或细木条固定，并减少骨折部位的活动，迅速送兽医处理。



如何给爱猫服药

无论是喂什么样的药，都要给猫咪创造一种宽松自然的气氛，不要一开始就很多人声势浩大地围上来，药还没喂，猫咪先惊了。最好使猫采取站着的姿势，也就是四肢都着地，如果它背部、屁股着地，就有可能前脚或者后脚来对付你，这样局势将无法控制。手势上，你可以先轻抚猫咪的颈背部皮毛（因为后面喂药的时候要用一只手抓住颈部皮毛固定），轻声和它说话或叫它的名字，让它放松。以下是各种性状药品的喂服方法。



片剂

1. 右手拇指与食指捏住药片。
2. 左手从抚摸颈部无声无息地迅速过渡到紧抓猫咪颈部比较松弛的皮毛。
3. 左手把猫咪头部微微提起大概成 45° ，用右手中指刺激、抠开猫的下颌并抵住使之不能闭合。
4. 迅速把拇指和食指捏着的药片放入猫咪嘴中，放的位置越靠近嗓子眼、舌根部越好，这样它不方便用舌头把药弹出来。
5. 迅速用手闭合猫咪的上下颌稍加固定，让它没有机会吐出或摇头甩出药片。不要立即松手，等待片刻，慢慢松开确定药咽下就可以了。

注意：有的比较机灵的猫，在吃过几次药以后会学会把药含在嘴里，等人松手后再偷偷吐出来。对付这样的猫就要延长第5步的时间，必要的时候可以用手指从外面捏一下咽喉处刺激一下，看见它有几次吞咽动作，药片基本就下去了。

水剂

流体的药物都可以用这种办法喂，固定方法同上。右手持一个去掉针头的注射器，从猫咪的嘴角（也就是后面槽牙的空隙）处把药水注入。

注意：如果是味道不太难喝的药水或者是水（有的病需要大量增加饮水，比如尿道炎、尿结石），可以缓缓给药，猫咪嘴里有了液体也许会反射性地吞咽，这样不容易呛到。

如果是比较难喝的东西，猫咪抵触很激烈，就要把药分成几次喂，每一次控制在猫一口能咽下的量，大概也就是1毫升左右。喂的时候要一次性快速打入嘴里，这时就要注意不要直对嗓子眼打了，很容易呛到。

膏状

固定方法、喂药步骤基本同药片的喂法。把药膏挤在右手食指上。还有一种简单的方法就是把药膏抹在猫的口鼻处，它不得已也只能自己舔进肚了。

胶囊

胶囊的喂法可以参考药片的喂法。如果胶囊太大不易下咽的话可以把胶囊拆开，取出药粉溶成水，按照水剂的方法来喂。

注意：把固体药溶成液体来喂，要考虑到药物溶解以后的有效时间，最好是喂多少溶多少，不要提前溶解很多，以免喂的时候失效。

胶囊药一般比较苦，溶成水的量最好在1毫升左右，以便一口吃下，减少痛苦。



猫的免疫与驱虫

疫苗与免疫

目前，国内动物医院和诊所常给猫进行疫苗注射，常用疫苗包括：进口的猫三联疫苗、狂犬疫苗，国产狂犬疫苗、猫瘟热疫苗。注意，只有健康的猫才能接种疫苗。



1. 猫三联疫苗:

猫三联疫苗是进口的猫疫苗,为国际上通用的产品,预防猫瘟热、猫杯状病毒感染和传染性鼻气管炎。免疫接种方法:2个月以上的猫需免疫(肌肉注射)2次,间隔2~3周;以后,每年免疫注射1次。

2. 狂犬病疫苗:

有国产和进口的两种产品,用于预防狂犬病的发生。3个月以上的猫即可免疫注射,保护期为1年,每年应接种1次。从临床效果上看,进口和国产狂犬疫苗效果均较好。

3. 猫瘟疫苗:

国产的猫瘟热疫苗为科研中试产品,对猫瘟热有一定的保护率。它是一种灭活的细胞疫苗,3~4月龄的幼猫即可接种,首次接种应肌肉注射2次,每次间隔4周;4个月龄以上的猫肌肉注射1次,免疫期为1年;以后每年注射1次。

4. 注意事项:

首先,只有健康的猫才能接种疫苗。

那么,怎么确认猫是处于健康状态呢?一般情况下,兽医应给猫做临床体检,包括体温、呼吸、心跳次数、体表检查和病史询问。正常幼猫的体温为 38°C ~ 38.5°C ,成年猫为 38.0°C 左右,但都不应超过 38.7°C ,除非个别的猫从闷热的汽车中刚出来,体温可能稍高。体表检查主要观察有无眼分泌物和鼻涕,口腔粘膜颜色有无异常,眼结膜有无增生血管,有无呕吐、厌食、腹泻等现象,有无传染病病史,是否与患病猫接触过。

其次,疫苗接种后,都有一定的保护率,但保护率不是100%。这说明,接种疫苗后的猫当抵抗力下降时,如果接触正患病的猫,也有可能患上传染病。

第三,疫苗注射7天左右,才能产生一定数量的抗体,为猫提供一定的保护力。因此,刚接种1~3天的猫,并非处于安全期,疫苗的作用没有完全体现出来。

第四,注射过血清的猫,需经20天左右才能接种疫苗,这样做是因为血清(含有一定的抗体)需要一定的时间才能从体内消失,或者下降至一定水平之下再接种疫苗。

第五,处于疾病(例如猫瘟)潜伏期的猫,当时并未发病,但接种疫苗后会在1~7天内发病,应予以治疗。

第六,正常接种疫苗,应每年1次,不能认为猫不出户,就不接种,或接种2~3次疫苗后就认为安全了,以后不接种也行,这会给病毒的传播提供机会,因为猫的主人是要接触外界的,可能是传染媒介之一。


另外,疫苗是生物制品,个别的猫接种后偶见过敏现象。因此,在动物医院为猫接种疫苗后1周内最好先不洗澡,以防过冷过热引发感冒,影响免疫效果,或者针眼被污染后引起感染。个别免疫力差的猫,注射疫苗后自身也不能产生足够的抗体,应予注意。

驱虫

一般,3个月龄的猫就可以驱虫了,每年2次,普通广谱驱虫药即可。猫易患绦虫病,平时少吃生的肉食、鱼类。

训猫篇

训猫篇



新来猫咪的管理方法

把猫放在适当的宠物专用箱带回来很重要，如宠物航空箱，如果你用铁丝笼装猫最好在笼子外罩个布罩，不要用纸箱。如果是从朋友家带回一只成猫，最好能要求带回一件这只猫所熟悉的用品。例如，这只猫平常用惯的便盆、猫窝或玩具，它会感到比较安全，而能较快地在新地方安定下来。



当你为猫准备好一切必需品之后，你应该仔细检查家中是否有对于一只好奇心重的猫有不安全的因素。

到家后，就放手让新来的猫自己去熟悉新环境，而且不要让它受到其他宠物的干扰。最好不要让家中的小孩去逗新来的猫咪。如果孩子们以前从未养过宠物，尤其需要注意。



家中应注意的安全事项

1. 在新猫来家前，要把有危险的物品挪到猫够不着的地方；
2. 不要让猫碰到炉架，或者应在炉边安装护栏；
3. 随时注意关好洗衣机、电冰箱、冰柜、烤箱、微波炉的门；
4. 值钱的、易碎的摆设品要放在猫够不到的地方；
5. 切记不可在室内和在猫其他的活动场所里种植有毒的植物；
6. 凡是垃圾废物，千万别让猫够到；
7. 不要让猫啃电线，不用时请切断电源；
8. 在火炉边或在其他的明火周围请安装护栏；
9. 不要把有尖头的器具随手放在外面；
10. 不要把家中有毒的物品放在猫能够到的地方；
11. 不要把塑料袋丢放在屋内，如果猫钻进去，就有可能因窒息导致死亡；
12. 不准猫在灶台、特别是炉架上走，当你在煮汤或用油煎食物时，不要让猫靠近；
13. 不要把烧热的电熨斗放在猫能碰着的地方；
14. 不要随手丢放小件物品，以免被猫吞食或踩着；
15. 不准猫爬到高高的阳台上；
16. 请注意随手关好每个房间的纱窗。



DINK CAT

训

练

猫猫不认生



猫原本是谨慎小心的动物，对素不相识的陌生人通常会采取置之不理的态度，有时还会逃走。也许有的人觉得只要猫和主人关系亲密就很满足了，但如果周围的人都认可并且喜爱你自己喜爱的猫的话，终究是一件令人高兴的事情。即便是野猫也有喜欢和人亲近的，但也存在被很爱惜地饲养的纯种猫与人认生的情况，由此可见猫的性格是各种各样的。从幼猫时期开始就经常被人抱，经常和人一起玩的猫会喜欢和人亲近。

短毛的猫喜欢被人抱，但长毛猫不喜欢被抱的情况好像也很多，正因如此，从幼猫开始就尽量多抱抱它。但也不要让猫觉得厌烦，不要勉强地抱猫。有时和猫一起玩，给它投球，或者一边逗它一边抚摸它。如果主人是单身生活或家庭成员较少的情况，也可经常让喜欢猫的朋友到家里来玩，来让猫体验一下与陌生人的交往吧。

如果主人是单身生活，白天只有猫在家的情况下，回家后与猫进行肢体交流就显得更为重要了。也可以在出门的时候，使用录音电话跟猫谈话，使它习惯于人的声音。总之一定要每天和它接触，让它感受到主人对它的重视。

猫咪


训练的注意事项

1. 掌握好训练的年龄和时机：猫的训练应在2~3月龄时开始，这时较易接受训练，并为今后的提高打下基础。如果是成年猫，训练起来就比较困难。训练猫的最佳时间是喂食前，因为饥饿的猫愿意与人亲近，比较听话，食物对猫的诱惑力使训练容易成功。

2. 态度和蔼，各种刺激结合：猫的性格倔强，自尊心很强，不愿听人摆布，所以，在训练时，要将各种刺激和手段有机地结合起来使用，而且态度要和气，像是与猫一起玩耍一样，即使做错了，也不要过多地训斥或惩罚，以免猫对训练产生厌恶，而影响整个训练计划的完成。

3. 要循序渐进，不能操之过急：一次只能教一个动作，切不可同时进行几项训练，猫很难一下子学会许多动作。如果总是做不好，也会使猫丧失信心，引起猫的厌烦情绪，给以后的训练带来困难。每次的训练时间不宜过长，不能超过10分钟，但每天可多训练几次。

4. 训练的环境要安静：不能几个人同时训练，以免分散猫的注意力。训练的动作不能太突然，不能发生巨大的响声，因猫对巨响或突如其来的动作非常敏感，以免把猫吓得躲起来，而不愿接受训练。







怎

样

矫正猫的夜游症

猫有昼伏夜出的习性，如果任其夜间到处游荡，在捕鼠、交配和撕打的过程中，有可能受到伤害或弄脏身体，不利于猫的健康，也影响室内卫生。这样的猫往往野性很强，不好饲养管理。如果带回传染病，还可能殃及主人的健康。因此，家庭养猫不能任其夜游。纠正猫的夜游性必须从幼猫开始。首先要用笼子驯养猫，白天放出，在室内活动，但绝不能放到户外，晚间再捉回笼内。

时间一久，猫就会养成习惯，即便去掉笼子，夜间也不会出去活动。若实在难以纠正，可以在夜间对猫进行药物催眠，白天用少许兴奋药物，勿须多长时间，夜游的习惯就会纠正过来。也要尽量避免长时间放出户外，或任其自由出入，否则会导致猫的劣性复发。



阻止

猫的异常捕食行为



过去家里养猫一般都是为了防鼠，猫在一般情况下主要捕捉老鼠、苍蝇、蜥蜴、鸟等小动物。现在养猫很多人都是当宠物养的，根本无须猫去捕捉老鼠，但由于猫的天性，其捕捉小动物的兴趣依然不变。很多家里养猫的朋友，由于喜爱动物，同时会饲养一些其他宠物，如兔、仓鼠、小鸟和鱼等宠物。正常的猫一般是懂得不去捕食这些家庭伙伴的，但对有些猫，特别是狸猫一类的家猫，主人就要小心它的行为了。

当猫看见家里其他宠物，马上就要进行骚扰并试图捕食时，主人应立即予以纠正。开始可将宠物带到猫的跟前，猫有图谋行为时，马上严厉呵斥它，必要时轻拍猫头警告。平时不在家时，可将捕鼠夹倒置于兔笼、鸟笼或鱼缸旁，惊吓前来捣乱的猫。也可手持喷水枪在远处观察猫，当猫有错误行为时，突然射水惊吓它，均能收到很好的效果。还有一个方法就是在猫脖子上套只铃铛，当猫靠近鸟或兔等动物时，铃铛的响声会引起它们的警觉而及时避开。





如何

避免猫咪抓沙发

磨爪是猫咪的天性，不可能改变。但是猫咪别的地方不抓，就是喜欢抓沙发，刚买的沙发过不了多久就已经伤痕累累了，这也是非常让人头疼的事情。作为猫咪的主人首先要尊重猫咪的天性，其次，为了猫咪能更和谐的在家中生活，你可以通过一些措施来改掉猫咪抓沙发的坏习惯。



1. 给猫咪准备可以给它抓的东西：

这是最重要的原则，既然猫咪的天性是不能改变的，那么禁止猫咪抓一个地方的同时要给猫咪提供另一个可以磨爪的地方，这个非常重要。

你可以专门给它准备一个磨爪板（最好是天然材质的，如麻绳、木头等），垂直固定好，然后训练猫咪去那里磨爪。必要时可以使用一些猫薄荷吸引猫咪过去磨爪。现在市面上还可以买到已经喷洒了猫薄荷的猫抓板，大部分猫咪都很喜欢用。另外，一些天然材质做的草垫子也是一些猫咪的最爱，比如家里可以买到的互花草编地垫，有的猫咪会很自觉地在上面磨爪的。

2. 准备一把水枪，在它去抓沙发的时候教育它：

猫咪非常害怕突如其来的“袭击”。当猫咪准备抓沙发的时候用水枪喷它一下，猫咪会非常害怕地逃走。多使用几次这个方法，就会让猫咪形成一种条件反射：去沙发那里磨爪等于被未知的东西突然袭击，自然而然猫咪就会放弃沙发了。这个办法曾经让一只已经有7年沙发磨爪史的猫咪改掉了坏习惯。

水枪的喷射对猫咪来说是没有什么伤害的，只是起到警示的作用。不过要注意的是，不要将水射到猫咪的耳朵里。

3. 在沙发上它喜欢抓的地方喷上柠檬水：

柠檬水的味道猫咪不喜欢，同样桔子皮的水猫咪也很讨厌。其他的不受猫咪欢迎的味道还有花露水、风油精等。猫咪去磨爪的时候闻到这些味道，一定是会避开的。

如果你也有猫咪抓沙发的困扰，不妨试试上面的建议，如果这些都做到了，那么在让猫咪拥有了新的磨爪乐趣的同时，你的沙发也可以安全了。对于其他的家具你也可以按照这个办法试试看。

猫病防治篇

FANG ZHI PIAN





病因

肠炎是指肠黏膜及其深层组织炎症的总称。常表现为腹痛、腹泻、呕吐、发热以及毒血症，肠炎是猫常见的消化道疾病。

原发性肠炎主要是由于猫采食了腐败变质的食物、动物废弃物及被病原微生物污染的食物和饲料，或者误食毒饵、农药污染的食物、刺激性药物、异物等都可导致肠炎。当机体抵抗力降低时（感冒、发烧、营养不良、疲劳、应激等），肠道屏障功能减退，肠道内致病菌大量繁殖，导致发病。此外，滥用抗生素也可导致肠道的正常菌群失调，引起再次感染，导致肠炎的发生。

继发性肠炎常见于某些传染病（如猫泛白细胞减少症）、寄生虫病（如弓形虫、球虫）、中毒病（如有机磷中毒）以及其他疾病。

症状

猫肠炎的症状表现不同，因致病原因、炎症性质、疾病发展阶段不同而差异很大。

初期主要表现为消化不良、食欲减退、粪便带有黏液。当炎症波及黏膜下层组织时，猫的精神高度沉郁、体温升高，食欲废绝。饮欲初期增加，后期废绝；腹壁肌肉紧张，眼窝下陷，血液浓稠，皮肤弹性降低，尿色加深、尿量减少。此病后期可发生尿毒症。

触诊敏感或疼痛反抗，经常卧于凉的地面，或以肘及胸骨支于地面，而后躯高起做“祈祷”姿势。


濒死期体温降低、四肢冰冷、陷入昏迷状态，全身抽搐而死。

其他症状表现：

1. 小肠炎症表现为口干舌燥、灼热、眼结膜黄染、频频呕吐，有时呕吐物中带有血液，粪便软或干，色深，带黏液和浓汁。

2. 大肠炎症先为剧烈腹泻，频频怒责，做排粪动作，但很少有粪便排出。粪便恶臭或排出少量黏液或血液。病后期，肛门松弛，出现排粪失禁情况。

依据病史和症状，肠炎不难诊断，但要建立特异性诊断，则需要进行粪便检查、消化道钡餐、X线造影检查、血液检查以及尿液检查等等。



防治

治疗本病的原则是去除病因、加强护理、杀菌消炎、镇静止吐、缓泻、止泻、强心补液、纠正自体中毒以及对症治疗。

对原发性胃肠炎要及时清除致病因素，继发性胃肠炎要积极治疗原发性疾病。

要加强饲养管理和护理工作。病初要饮用口服补液盐，或给以冰砖，供其舔食，以减低渴感。禁食，病情好转后饲喂无刺激性易消化食物，如菜汤、肉汤、鱼汤、米粥以及少量的米饭，逐渐恢复为常规饮食。

细菌性肠炎必须使用抗生素，比如吡哌酸、诺氟沙星、环丙沙星、依诺沙星、氧氟沙星、呋喃唑酮、磺胺脒、复方磺胺甲噁唑、甲氧苄啶、庆大霉素、卡那霉素、氯霉素、四环素、强力霉素、黄连素、双黄连等，同时搭配使用肾上腺皮质激素效果更好。另外，也可用灌肠法进行治疗，用0.1%高锰酸钾溶液灌肠（适用于以大肠为主的炎症），效果颇佳。

病毒性肠炎最好应用特异性抗血清与黄连素、双黄连等抗病毒药物联合使用治疗，此外还要配合使用抗生素，可以防止细菌性感染。

寄生虫性肠炎应以驱虫为主，根据不同的寄生虫选用不同的抗寄生虫药物，同时使用抗生素，以防继发感染。



对腹痛不止、呕吐严重的病猫，可使用镇静剂，如氯丙嗪、地西洋、阿托品等缓解肠道痉挛的药物。

以小肠炎为主的肠炎可缓泻以清除肠内有毒物质，减少毒素的吸收，减轻中毒症状。通常采用油类泻剂，如石蜡油、花生油，必要时可同时使用少量的盐类泻剂。盐类泻剂要慎用，否则不但对肠炎的治疗无益，反而会因刺激加重炎症。

以大肠炎为主的肠炎常用硅碳银、白陶土、活性炭、鞣酸蛋白等止泻剂。可在腹泻不止、粪便已基本没有臭味的条件下使用。

对病情严重、脱水、心功能较差的病猫要强心补液，以增加心脏功能、补充体液、缓解电解质紊乱，可使用安钠咖、樟脑磺酸钠、樟脑水、复方盐水、生理盐水等渗糖盐水，同时搭配营养性物质。治疗自体中毒应视中毒的性质而定，若呕吐严重而腹泻较轻或没有腹泻症状，应补充氯离子或弱酸性药物，如乳酸、氯化钠。若持续性腹泻，则应缓解酸中毒，补充碳酸氢钠，同时附以钾离子，以补充因腹泻丢失的钾。

对出血性肠炎应使用维生素K、卡巴克络、酚磺乙胺、仙鹤草素等止血剂，制止出血。

猫烧伤



烧伤是皮肤受热作用下所发生的皮肤损伤。由于其热量和作用时间不同，其损伤程度也有很大差异。猫很少发生烧伤，但一旦烧伤后果就非常严重，因此不仅对于局部，而且必须加强全身护理。

原因

1. 由火、热汤、蒸气、灼热金属、电、火灾和磨擦等引起。
2. 若使麻醉或极度衰弱动物长期卧于保温板上时，接触于电热板的组织因受到压迫，其组织血液循环受到障碍，从而导致严重的烧伤。

症状

1. 局部症状：

根据组织损伤的深度，可划分为3种程度烧伤，不过猫不易发生水泡。因此，也有人提议猫适合使用过去的2种程度烧伤的分类方法。

(1) 1度烧伤（红斑性烧伤）为表皮最表层的轻度烧伤，皮肤变红和出现轻度肿胀。

(2) 2度烧伤（水泡性烧伤）的创伤波及到真皮，在表皮处形成水泡，皮肤较比1度烧

伤更红，而且出现明显的肿胀和疼痛，真皮毛细血管和小静脉扩张且淤血，出现血浆渗出，皮下组织发生水肿。

(3) 3度烧伤(坏死性烧伤)含有皮肤附属器官和神经的皮肤全层受到伤害，有时甚至波及到皮下组织和肌层。组织陷入坏死，形成焦痂，被毛容易脱落，为鉴别损伤程度的一个标志。

2. 全身症状:

(1) 在发生烧伤时，其损伤的范围大小较深度更为重要。当发生2或3度烧伤的面积为体表的15%~20%以上时，体液丧失并引起烧伤性休克。当体表的50%以上发生烧伤时，就会导致死亡。

(2) 发生大面积烧伤时，从烧伤创面上将大量的丧失水分和血浆成分。由于水分在蒸发时以蒸发热的形式丧失热量，同时吸收坏死组织的分解产物等而引起各种症状。

(3) 当发生严重病情而出现休克时，体温出现下降，而中等程度的病例，体温升高。除此之外，还出现心跳加快、脉搏微弱、血压下降、意识迟钝甚至消失、发绀、无尿、痉挛和呕吐等症状。

治疗

1. 局部疗法:

(1) 浅烧伤仅对于创伤进行清洗处置即可。剪毛后，使用刺激较少的消毒药(0.05%洗必泰)、手术用聚烯吡酮碘液或生理盐水等清洗创面和冷敷。

(2) 深烧伤若为受伤2小时以内的烧伤，对创面以3℃~17℃(15℃左右为好)进行30分钟的冷却。

(3) 对于烧伤的治疗，要和手术时一样，尽量采取无菌操作，对局部用上述消毒液进行充分清洗。

(4) 要认真进行创面切除术，虽然很难确定发病初期猫的烧伤范围，但要大量地切除坏死组织；当形成水泡时，要穿刺内容物，但不能去除被膜。

(5) 为了预防感染和促进肉芽组织的形成，将0.5%硝酸银溶液(用沾有湿布或1%磺胺嘧啶的纱布)、在白色凡士林中加有抗菌素的软膏或者硫酸庆大霉素软膏等，在创面上涂上2~3层，并同时采用温水浴、淋浴器等，清洗创面，去除坏死组织。

2. 全身疗法:

(1) 由于烧伤往往危及生命，因此，应及早确定治疗上的先后顺序，首先在检查呼吸道、呼吸和循环状态并采取相应措施后，开始实施对于烧伤的治疗。

(2) 认为烧伤为中度或重度时，应立即实施乳酸林格氏液的输液。

(3) 在循环已处于稳定状态后的第3~5天，需要采取积极的营养补给。

(4) 全身应用抗生素是理所当然的。但是，对于大面积的烧伤治疗需要较长的时间，当长期使用抗生素后，会发生对抗生素无效的败血症，甚至会导致念珠菌败血症。此外，对于3度烧伤，抗生素很难到达创面局部，因此，一般不进行预防性应用。





病因

猫咪难产是指猫在分娩过程中不能将胎儿顺利娩出体外的一种疾病。本病的发生既有母体的因素、也有胎儿的因素。母体因素有产道狭窄（主要是软产道扩张不全及骨盆未充分扩张）和产力不足（包括腹压不够和子宫阵缩有问题，如子宫乏力、子宫破裂、子宫扭转等）两个方面。常见的胎儿因素有胎儿过大（包括绝对过大和畸形发育）、胎儿位置不当（包括胎位、胎向、胎势异常）。过于肥胖或过早怀孕的母猫均易发生难产。较小品种的母猫与较大品种的公猫交配，也容易发生难产。

诊断要点

- 1.** 预产期已到或已过，出现分娩预兆，但阵缩次数少、时间短、力量弱、胎儿久不娩出，检查母猫，胎儿仍留在宫内。
- 2.** 已分娩出1个或数个胎儿，母猫仍有分娩动作，检查发现子宫内仍有胎儿，但迟迟不能将所剩胎儿排出体外。
- 3.** 少数猫生出数只胎儿后，分娩动作即告停止，但仔细检查，腹内仍有胎儿。因此，宠物主人和医护人员都应注意这一点，在条件允许和必要时，可利用B超进行监护。

4. 产道触诊及腹部触诊是诊断猫咪难产最方便、最常用、最经济的方法。触诊内容包括有无胎儿、软产道的开张情况、胎儿的发育情况以及胎位、胎向及胎势是否正常等。

防治

1. 治疗体格较幼猫咪的难产时，采用牵引术、矫正术、截胎术等助产措施多难以奏效，通过阴道、直肠检查确定胎儿的位置、方向、姿势等亦有一定困难。因此，对胎儿和产道方面因素所引起的难产应尽快采用剖腹产术，手术愈早，胎儿成活率愈高，母体康复越快。由于阵缩微弱、产道干燥所致的难产，可采用药物催产和人工助产措施。

2. 药物治疗：最常用的药物是催产素，每次肌肉注射2~5单位。先用雌激素作预处理则效果更佳。应注意的是，阻塞性难产严禁使用催产素。产道干燥的，可用无菌胶管或漏斗向产道和子宫内灌入液体石蜡或胡麻子油1~2毫升，待产道润滑后，采用助产方法促进胎儿的娩出。如软产道开张不全，且胎儿情况良好，可先用雌激素处理使软产道充分开张，然后自行分娩或手术助产。

3. 手术疗法：

(1) 用手指和产钳经阴道取出胎儿的方法。病畜站立固定于手术台上，清洗阴门及周围区域并消毒，向产道内灌入适量润滑剂。术者操作时要严格遵守消毒规则。无论是徒手还是用器械助产，在阴道不收缩的情况下，将手指或器械伸入产道后，均须用手在腹壁外将胎儿固定住，这样里外配合，将胎儿拉出。

(2) 会阴切开术。适用于相对或绝对阴门狭窄引起的难产，在临床上应用这种手术解救难产的机会不多。

(3) 剖腹产术。



猫钩虫病

病因

是由狭头钩虫寄生于猫的小肠内引起的一种寄生虫病。

症状

消化不良、下痢和便秘交替发生，粪便带血或呈黑油状，食欲大减，时而呕吐，异嗜，体况下降、消瘦、贫血，严重时导致昏迷和死亡。

防治

(1) 保持猫舍的清洁卫生，及时清理粪便，常用消毒药水喷洒猫活动的场所以杀灭幼虫，并对猫进行定期驱虫。

(2) 药物治疗可用左旋咪唑按10毫克/千克体重，1次内服；或用噻苯唑按10毫克/千克体重，1次内服；或用害获灭（依维菌素）0.3毫克/千克体重，皮下注射。



猫蛔虫病


病因

蛔虫存在于自然界中，各种家畜、动物以及人均可感染，猫也不例外。蛔虫病是幼猫常见的寄生虫病，亦是人兽共患寄生虫病中最常见的一种。

猫弓首蛔虫是猫最常见的蛔虫，寄生于猫的小肠中。雄虫长3~7厘米，雌虫长4~12厘米。虫卵大小 70×65 微米。虫卵随粪便排出体外，在适当的条件下，经10~15天发育为感染性虫卵，污染食物、饮水等，当猫吞食感染性虫卵后，幼虫在小肠内逸出，移行至肠壁、肺、气管，经咽部吞咽又回到小肠内发育为成虫。老鼠是蛔虫的传递宿主，猫吃了这种老鼠亦可感染蛔虫病。

症状

一般少量虫体寄生时，无特殊变化。大量虫体寄生时，会引起消化障碍、呕吐、腹泻、腹泻便秘交替出现，有时在粪便中可见到成虫；生长缓慢、被毛粗乱、食欲废绝、贫血、腹部膨胀、神经症状。幼虫移行引起腹膜炎、败血症、肝脏损害和蠕虫性肺炎。




治疗


1. 内服驱蛔灵，每次每千克体重125毫克。
2. 内服海群生，每次每千克体重10~25毫克。
3. 内服芬苯哒唑，每天每千克体重50毫克，连服3天。

预防

1. 搞好环境、猫体、食具、食物的清洁卫生，及时清除粪便，保持猫舍清洁干燥。
2. 定期驱虫，每年春秋两季各进行一次驱虫。
3. 加强饲养管理，进行日光浴等以增强猫体抵抗力。



DINK CAT



毛球症

病因

在猫咪消化道中的毛球来源是，猫咪整理自己身体时食入了大量体毛，当这些毛球无法通过消化道(肠和胃)时，或不能被胰蛋白酶分解时，这些毛球就形成了消化道的一大障碍，身体的自然反应就是把毛球吐出来。



症状

若猫咪无法将毛球吐出来，就会得所谓的“毛球症”，很多的毛球阻塞了消化道而且会在肠内变得又大又硬，情形严重会精神不振、食欲不佳，需要用外科手术来排除，相对的并发症也会比较多，如炎症性肠道疾病。

治疗

1. 每天帮爱猫梳毛：

这是最好的方式之一，首先，要准备好两种刷子，一种是不锈钢齿梳，另一种是梳毛刷。

每天梳毛的好处除了你可以帮爱猫把毛发整理干净、把多余的旧毛梳下来外，借此你也可以顺便看看爱猫的身体状况，很多的小症状都是饲主从梳毛中发现的，而且这样的一种亲密行为，会让你的爱猫更了解到它的饲主是关心它的、爱它的，人和猫才能很快乐地一起生活。

2. 食用化毛膏：

顾名思义，化毛膏就是帮助猫咪清除体内积毛的用品，常有饲主问：“什么时候给猫咪吃化毛膏？”简单地说，只要爱猫有舔毛的行为，就可以开始吃化毛膏，用量及次数就依照说明书的作法即可。市面上有很多种品牌的化毛膏，各种品牌的味道也不尽相同，若你换了品牌，爱猫有时会有罢吃的现象，解决的方法就是换用它原来喜欢吃的品牌食物，或者是把化毛膏涂抹于猫咪鼻子上，猫咪就会把化毛膏吃完了，只不过若猫咪真的不喜欢吃，还是选择适口性佳的化毛膏较好。

皮炎



病因

皮炎泛指由各种刺激及过敏、创伤以及细菌、真菌、病毒、寄生虫感染引起的皮肤炎症。

症状

病猫瘙痒，搔抓，皮肤红肿、起疹、发泡、渗出、结痂或脱屑，可继发感染。慢性者红肿减轻，渗出、丘疹减少，皮肤发干、皲裂。

治疗

1. 对急性湿性皮炎，可用收敛剂（如把5%鞣酸和5%水杨酸加在70%的异丙醇溶液中）外敷；口服泼尼松龙，每千克体重1毫克，连服5~7天；肌注甲泼尼龙，每千克体重1毫克。对慢性干性皮炎，可用水杨酸除去痂皮、鳞屑后涂擦考的松软膏。
2. 防止动物搔抓舔咬，加重炎症。可全身应用糖皮质激素止痒消炎，并用硬质的大脖领限制猫回头啃咬，用布包裹爪子防止猫搔抓。



猫狂犬病



病因

与狗的狂犬病病毒相同，又称恐水症。以病猫狂躁不安、意识紊乱、对环境刺激反应过大、攻击其他动物、最后麻痹死亡为特点。目前，在国内家猫中发病率极低，但应予足够的认识。

病毒

属于弹状病毒科狂犬病毒属，外形呈子弹状。此病毒不耐热，在100℃时2分钟、50℃时1小时灭活，对酸、碱、新洁尔灭、福尔马林等消毒药均敏感，70%的酒精、0.01%碘液以及1%~2%的肥皂水亦能使病毒灭活。患病和带毒动物是本病的主要传染源。病毒主要存在于患病动物的唾液内，在临床症状出现前15天和症状消失后10天均带毒。健康猫主要经伤口（皮肤抓伤、咬伤、粘膜破损处）感染，可传染人。

症状

潜伏期根据伤口部位和病毒含量而不同，初期，病猫躲藏于阴暗处鸣叫，反抗过度，对声光反应亢奋；而后狂躁不安，富于攻击性，或自己咬伤自己；眼光凶而直，不听主人命令，流涎；精神逐渐沉郁、行步不稳，后肢麻痹而倒地，因全身衰竭而亡。病程2~4天不等。

诊断

主要根据未注射疫苗，与其他动物搏斗所致伤口和症状做判断。确诊需要荧光抗体法或生物学试验。

防治

幼猫3月龄时接种狂犬疫苗，以后每年1次，效果良好。猫咬伤人后不要包扎伤口，应将血挤出多次，并及时用肥皂水冲洗。



症状

发病时，可出现淋巴结肿大及发热症状。有被猫咬、抓伤病史，结合实验室检测可确诊该病。该病确诊后对症治疗一般愈后良好，只有免疫功能低下者才可能发生严重的全身病况，如心、脑等并发症，极个别者甚至会死亡。

病因

相对于狂犬病，人们对猫抓病还比较陌生，很多人会认为这种病不好治疗，而医学专家告知，猫抓病可防可治，大可不必惊慌，但一旦被猫咬、抓伤后出现症状，应及时向医生提供病史。猫抓病是一种人畜共患的感染病，一般认为其病原体为革兰阴性棒状杆菌等致病菌。该病潜伏期一般为10~30天，少数的可以为几个月乃至一两年。

防治

在防治方面，首先要注意养猫的卫生，有关资料显示，约有10%的宠物猫及33%的流浪猫血液中携带此菌。猫之间的感染主要通过跳蚤进行。鉴于猫抓病可对免疫低下者造成严重恶果，因而慢性病患者与免疫力低下者最好不要养猫；其次要避免被猫咬、抓伤，尤其在春季动物发情期和夏天闷热时，尽量少刺激猫，以免被其咬、抓伤。被猫咬、抓伤后，应及时上医院，并注射狂犬疫苗。当出现淋巴肿大、畏寒发热等症状时，一定要将被猫咬、抓伤的病史告诉医生，以利正确诊断，及时治疗。



猫癣是一种传染性很强的疾病，可以传染人，但在人身上一段时间比较短，对猫来说就是持久战。虽然不至死，但非常麻烦，所以新猫进家以后一定要隔离。

现在发现有5种真菌能引起狗猫的皮肤病，有犬小孢霉、石膏样小孢霉、须毛癣菌、奥杜安小孢霉和变形小孢霉，其中犬小孢霉最常见，其次是石膏样小孢霉。

首先说说犬小孢霉，犬猫钱癣70%是由这个真菌引起，主要在皮肤形成类圆形痂皮，虽说叫犬小孢霉，但也可以感染猫，而且全年都可发病。犬小孢霉对人主要引起头癣。石膏样小孢霉生存在土壤里，人也易感染，本病起病较急，病损严重，有时候引起皮肤大面积病变，很容易继发细菌感染，局部发生渗出性化脓，转为慢性后可延续数月甚至数年。奥杜安小孢霉和须毛癣菌一般都是由人传染给狗猫，狗猫传染给人可能性很小，前者主要引起儿童头癣，后者是脚癣的主要病原菌。

那么真菌是如何传染的呢？主要是直接接触传染，另外接触被污染的器具、梳子、剪刀、垫物等也可以引起间接传染。不过真菌毕竟和细菌病毒不一样，传染性不强，一般当机体抵抗力下降，免疫下降的时候才会感染，比如大剂量用了激素，以及得了一些免疫性疾病。另外营养不良，体弱或处于炎热潮湿的气候也有可能感染。所以只要自己免疫力正常，平时注意卫生清洁，小孩得了真菌后，只要注意不要密切接触就没什么可担心的。值得注意的是，当皮肤真菌病痊愈后对同种皮肤真菌便产生了抗体，可持续1年或半年不等，猫有的可以到2年，另外有些真菌病还有自限性，未经治疗，可以自行痊愈。



猫牙周炎

牙周炎又称齿根膜炎，是指发生于齿周围组织的炎症，在口腔疾病中最常见。从齿龈局部开始出现炎症，进而发生齿龈与釉质相分离，并波及牙周膜发生炎症。如果不及及时治疗，就会出现牙周膜病变和牙周膜形成孔洞，进而破坏齿槽骨。



病因

1. 由附着于齿龈缘的齿垢中的细菌引起齿龈炎，并波及牙周膜。此外，齿石刺激齿龈而诱发齿龈炎，引起齿龈与釉质相分离，导致牙周膜感染细菌的机会增加。

2. 外伤、异物及化学物品等对于齿龈组织的损伤和齿的排列不整等。

3. 当一般治疗方法不能奏效时，可以怀疑全身性疾病（肾病、白血病、糖尿病等）诱发齿龈炎。

4. 老年猫或常饲喂加工的柔软食物的猫，由于容易在齿龈上黏附齿垢，而诱发牙周炎。




症状

1. 发生口臭要意识到发病。
2. 出现流涎、吞咽困难和下颌淋巴结肿胀，进而精神沉郁和食欲减退。
3. 厌恶开口，出现用前肢挠抓口的异常动作。
4. 牙龈潮红肿胀，可见从牙龈边缘出血。
5. 牙龈的缺损加大，当炎症波及齿槽骨时，牙齿出现松动。
6. 在上颌犬齿的牙龈上形成孔洞，若不及时治疗时可波及至鼻腔底，并形成口鼻瘘管。

治疗

1. 认真清除齿垢、齿石和食物残渣，同时磨滑齿根表面，并按摩牙龈壁。目前常用超声波齿石去除器，但是使用时由于需要喷洒一定量的水，因此必须插入气管导管后进行操作。
2. 残留的齿石用手去除，然后用研磨器使牙齿磨滑。
3. 当形成牙龈孔洞时，实施牙龈切除术。
4. 拔掉已松动的牙齿。
5. 使用抗生素。
6. 使用维生素A、C和复合维生素B。
7. 冲洗牙齿并按摩。
8. 每年做2次定期检查。



猫瘟热

是猫泛白细胞减少症，又称传染性肠炎，是猫科动物的一种高度接触性传染病，以高热、呕吐、腹泻、脱水和血中白细胞减少为特征。

猫瘟热的病原是一种细小病毒科的病毒，对环境的抵抗力强，低温下可以长期保存。



发病情况

各年龄未接种猫瘟疫苗的猫均可被传染，以1岁以下幼猫的感染率和死亡率为最高，成年猫有一定抵抗力，体弱及手术后易感染，目前是国内猫病中最严重的疾病。

症状

潜伏期2~9天，急性型24小时内死亡，亚急性病程为7天左右。一般发病后耐过7天而经过专业兽医正确治疗的猫可痊愈。高烧40℃以上，呈双相热，即发烧后24小时，体温下降，2~3天后体温再度升至40℃以上。精神差，不吃，呕吐物开始为食物，后为胃液，呈黄绿色，属于顽固性呕吐。腹泻发生在病后3天左右，后期呈咖啡色，是因为出血较多，高度脱水，本病有流行性。白细胞迅速减少，可降至 5×10^6 /升以下，当降至 2×10^6 /升以下时预示结果不良，难以治愈。

治疗

猫细小病毒单克隆抗血清，以1~2毫升/千克体重剂量，每日或隔日1次肌肉或皮下注射，连续2~3次为主要的治疗方法，临床效果明显；对症治疗包括止吐（胃复安）、抗生素防止细菌继发感染、静脉补液、止血等综合措施。如果发病初期（1~2天内）用以上方法治疗，临床治愈率高于国外水平。

注意事项

定期接种猫瘟疫苗。病猫应隔离。由于次氯酸对猫瘟病毒有杀灭作用，用次氯酸进行环境（如动物医院、家庭）消毒效果很好。

选择好的血清是必需的，因为抗体效价高，市场上各类血清较多，成本也不同，请猫的主人向兽医询问并留意。

如果猫未接受血清治疗而耐过疾病的，则终生免疫；注射过血清的，应20天后再接种猫瘟疫苗（单苗或猫三联疫苗）。

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

```
{
  "filename": "MTMwMDAwMzluemlw",
  "filename_decoded": "13000032.zip",
  "filesize": 18906116,
  "md5": "206c64d73bcd76ab0ac4b7835f970152",
  "header_md5": "e629e50c78ff1487a7cafb87fc727953",
  "sha1": "cccb0ed1dc66a6d4c6f4d286e5a658f4a592d7ae",
  "sha256": "e0f4d8d971514b22db18d3685c020ecd521249d9212941b06184063b76a3790d",
  "crc32": 33667171,
  "zip_password": "",
  "uncompressed_size": 21472274,
  "pdg_dir_name": "\u5ba0\u7269\u5927\u8054\u76df\u7eaf\u79cd\u732b_13000032",
  "pdg_main_pages_found": 99,
  "pdg_main_pages_max": 99,
  "total_pages": 105,
  "total_pixels": 526996496,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}
```